

T.C.  
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GRAPHİN LAPLACIAN SPEKTRAL  
YARIÇAPI İÇİN SINIRLAR

Soner SEZGİN

YÜKSEK LİSANS TEZİ  
MATEMATİK ANABİLİM DALI

KIRŞEHİR  
Nisan - 2012

T.C.  
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GRAPHİN LAPLACIAN SPEKTRAL  
YARIÇAPI İÇİN SINIRLAR

Soner SEZGİN

YÜKSEK LİSANS TEZİ  
MATEMATİK ANABİLİM DALI

DANIŞMAN:  
Yrd. Doç. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE

KIRŞEHİR  
Nisan - 2012

## ÖZET

$G = (V, E)$  bir graph olmak üzere,

$$L(G) = \begin{cases} d(v_i) & ; i = j \text{ ise} \\ -1 & ; i \neq j \text{ ve } v_i \sim v_j \text{ ise} \\ 0 & ; \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

biçiminde tanımlı  $L(G)$  matrisine graphın Laplacian matrisi denir. Bir graphın Laplacian matrisinin en büyük özdeğerine Laplacian spectral yarıçap denir.

Bu çalışmada bir  $G$  graphının Laplacian matrisinin özdeğerleri için matris normları yardımıyla alt ve üst sınırlar bulunmaya çalışılacaktır.

**Anahtar Kelimeler:** Graph, Laplacian matris, Laplacian spektral yarıçap, Hadamard çarpım, matris normu

## ABSTRACT

Let  $G = (V, E)$  be a graph. The  $L(G)$  matrix is defined

$$L(G) = \begin{cases} d(v_i) & ; \text{ if } i = j \\ -1 & ; \text{ if } i \neq j \text{ and } v_i \sim v_j \\ 0 & ; \text{ if otherwise} \end{cases}$$

The largest eigenvalue of Laplacian matrix is called Laplacian spectral radius.

In this study, we found bounds for eigenvalues of Laplacian spectral radius using matrix norms.

**Keywords:** Graph, Laplacian matrix, Laplacian spectral radius, Hadamard product, matrix norms.

## TEŐEKKÜR

Yüksek lisans öğrenimim boyunca olduđu gibi tez çalışmalarımın da her aşamasında her türlü desteđini ve emeđini esirgemeyen; deđerli zamanımı bana ayırarak engin bilgisinden ve hoşgörüsünden istifade ettiđim, sonsuz anlayış ve ilgiyle tezimin ortaya çıkmasına yardımcı olan saygıdeđer hocam Yrd. Doç. Dr. Őerife BÜYÜKKÖSE'ye ve Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü hocalarına minnettarlıđımı sunarım.

Yüksek lisans öğrenimim boyunca desteđini eksik etmeyen çok deđerli eşim Hava SEZGİN'e çocuklarım Emine İrem SEZGİN ve Elif Ceren SEZGİN'e de teşekkürlerimi sunarım.

## İÇİNDEKİLER DİZİNİ

ÖZET . . . . .	i
ABSTRACT . . . . .	ii
TEŞEKKÜR . . . . .	iii
İÇİNDEKİLER DİZİNİ . . . . .	iv
ŞEKİLLER DİZİNİ . . . . .	vi
1 GİRİŞ . . . . .	1
2 ÖN BİLGİLER . . . . .	2
2.1 GRAPH KAVRAMI . . . . .	2
2.1.1 Yollar ve Bağlantılılık . . . . .	2
2.2 BAZI ÖZEL GRAPHLAR . . . . .	5
2.3 GRAPH İLE İLGİLİ BAZI MATRİSLER . . . . .	8
2.4 BAZI CEBİRSEL YAPILAR . . . . .	11
2.5 MATRİS NORMU . . . . .	13
2.5.1 Bazı Özel Normlar . . . . .	13
2.6 HADAMARD ÇARPIMI . . . . .	15
2.7 MATRİS ÖZDEĞERİ . . . . .	16
3 GRAPHIN SPEKTAL YARIÇAPI İLE İLGİLİ BAZI SINIR- LAR . . . . .	18
4 NORMLAR YARDIMIYLA LAPLACIAN SPECTRAL YARI- ÇAPA SINIRLAR . . . . .	23

5 ÖRNEKLER . . . . .	26
KAYNAKLAR . . . . .	31
EK-A . . . . .	33
ÖZGEÇMİŞ . . . . .	34

## ŞEKİLLER DİZİNİ

2.1	Graph . . . . .	4
2.2	Döngü noktası içeren graph . . . . .	4
2.3	İzole nokta içeren graph . . . . .	5
2.4	Yönlü Graph . . . . .	5
2.5	Basit Graph . . . . .	5
2.6	$K_5$ Tam Graphı . . . . .	6
2.7	$K_{2,3}$ Tam Graphı . . . . .	6
2.8	Star(yıldız) Graph . . . . .	7
2.9	Ağaç Graph . . . . .	7
2.10	Regüler(düzenli) Graph . . . . .	7
2.11	6 noktalı graph örneği . . . . .	10



# 1 GİRİŞ

Graphların özdeğerlerinin çalışılması, matematiğin diğer alanları ile bağlantılar oluşturur. Özellikle spektral graph teorisi ve diferensiyel geometri arasında ilişki vardır. Kimyada; özdeğerler moleküllerin kararlılığı ile birleştirilebilir. Bunun yanı sıra graph, teorik olarak fizik ve quantum mekaniğinin çeşitli problemini de oraya çıkarır. Bizim amacımız bir basit graphın Laplacian matrisinin spektral yarıçapı için normlar yardımıyla sınırlar bulmak ve bulunan sınırların şimdiye kadar bulunan sınırlar ile kıyaslamasını yapmaktır.

Laplacian spektral yarıçapla ilgili bulunan pek çok sınır vardır. Fakat sınırların hiçbiri norma bağlı değildir. Bu çalışmada bulunan sınırlar; Laplacian matrisin Hadamard çarpımı şeklinde yazılması ve normlardan yararlanılması açısından önem arz etmektedir.

## 2 ÖN BİLGİLER

### 2.1 GRAPH KAVRAMI

**Tanım 2.1**  $V$ , noktalar kümesi ve  $E$ , kenarlar kümesi olmak üzere  $G = (V, E)$  yapısına **graph** denir.


Bir graphta bir  $v$  noktasından çıkan kenar sayısına  $v$  **noktasının derecesi** denir ve  $d(v)$  ile gösterilir.

#### 2.1.1 Yollar ve Bağlantılılık

$G$  deki bir yürüme(walk)  $W$  ile gösterilir.

$$W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots e_k v_k$$

sonlu sayıda elemanları noktalar ve kenarlar olan bir dizidir. Burada  $e_i$  kenarı,  $v_{i-1}$  ile  $v_i$  noktalarını birleştiren kenardır.



Bu yürümeyi kısaca

$$W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots e_k v_k = (v_0, v_k)$$


şeklinde gösterebiliriz.  $v_0$ 'a başlangıç noktası,  $v_k$ 'ya bitiş noktası ve diğer noktalara da iç noktalar denir.  $W$  yürümesine  $k$  uzunluğunda bir yürüme de denir.

Eğer  $W = v_0 e_1 v_1 \dots e_k v_k$  ve  $W' = v_k e_{k+1} v_{k+1} \dots e_l v_l$  birer yürüme (walk) ise  $v_k e_k \dots e_1 v_0$  yürümesi  $W$  'nin ters çevrilmesiyle

elde edilen bir yürümedir ve  $W^{-1}$  ile gösterilir.  $v_0e_1v_1 \dots e_lv_l$  yürümesi  $W$  ile  $W'$  nün  $v_k$  da bağlanması ile elde edilir ve  $WW'$  ile gösterilir.

$j < k$  olmak üzere  $v_0e_1v_1 \dots e_jv_j$  yürümesine  $W$  'nin bir alt yürümesi denir ve bazen  $i < j < k$  olmak üzere  $v_ie_{i+1}v_{i+1} \dots e_jv_j$  şeklinde olabilir. Buna da  $W$  'nin  $(v_i, v_j)$  kısıtlanması denir.



Basit bir graphta bir yürüme kenarlar atılarak sadece noktalarla gösterilir.



Eğer bir  $W$  yürüyüşünde  $e_1, e_2, \dots, e_k$  farklı kenarlar ise bu yürümeye trail (patika, iz, yol) denir. Buna ek olarak  $W$  yürümesinde noktalar da farklı ise bu yürümeye path (yol) adı verilir.


$G$  graphının  $u$  ve  $v$  noktaları arasında bir  $(u, v)$  yolu varsa  $u$  ve  $v$  noktalarına bağlantılıdır denir.

$V$  'nin bir boş olmayan alt kümelerini  $V_1, V_2, \dots, V_w$  parçalanışı vardır ki;  $u$  ile  $v$  gibi iki noktanın bağlantılı olması için gerek ve yeter şart  $u$  ile  $v$  'nin her ikisinin de aynı  $V_i$  kümesine ait olmasıdır.  $G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_w]$  alt graphları  $G$  'nin komponentleri olarak adlandırılır. Eğer  $G$  tam olarak bir tek komponenti varsa bağlantılıdır, diğer durumda  $G$  bağlantılı değildir.



Örneğin;


$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  ,  $E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 3), (3, 1), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\}$  olan bir  $G = (V, E)$  graphı aşağıdaki gibidir.



Şekil 2.1: Graph


1 ve 2'yi birleştiren kenar olduğundan  $1 \sim 2$  yazılabilir. 1 ile bağlantılı(komşu) kenar sayısı 3 olduğundan  $d(1) = 3$  olur.

**Tanım 2.2** Başlangıç ve bitiş noktaları aynı olan kenarlara **döngü** denir.



Şekil 2.2: Döngü noktası içeren graph


**Tanım 2.3** Graphta bir başka nokta ile bağlantısı ve kenarı olmayan noktalara **izole nokta** denir.



Şekil 2.3: İzole nokta içeren graph


## 2.2 BAZI ÖZEL GRAPHLAR

**Tanım 2.4** Herbir kenarı bir tek yönle belirtilen grapha **yönlü (directed) graph** denir.




Şekil 2.4: Yönlü Graph

**Tanım 2.5** Yönsüz ve döngü içermeyen graphlara **basit graph** denir.




Şekil 2.5: Basit Graph

**Tanım 2.6** Her noktası diğer noktalara bir kenar ile bağlı olan graphlara *tam graph* denir ve  $n$  noktalı bir tam graph  $K_n$  şeklinde gösterilir.




Şekil 2.6:  $K_5$  Tam Graphı

**Tanım 2.7 (İki Parçalı Tam Graph ( $K_{m,n}$ )):**  $G = (V, E)$  graphının kümesi bir kenarı birbirine bağlayan iki nokta farklı alt kümelerin elemanı olacak şekilde  $m$  ve  $n$  elemanlı  $V_1$  ve  $V_2$  gibi iki alt kümeye ayrılabilirse  $G$  graphına  $K_{m,n}$  iki parçalı graphı denir.




Şekil 2.7:  $K_{2,3}$  Tam Graphı

**Tanım 2.8** İki parçalı tam graphlarda  $m = 1$  ise; bu graphlara *star (yıldız) graph* denir.




Şekil 2.8: Star(yıldız) Graph

**Tanım 2.9** İki noktası arasında tek bir yol olan graphlara *ağaç graph* denir.



Şekil 2.9: Ağaç Graph

**Tanım 2.10** Bütün noktalarının dereceleri aynı olan graphlara *regüler (düzenli) graph* denir.



Şekil 2.10: Regüler(düzenli) Graph

## 2.3 GRAPH İLE İLGİLİ BAZI MATRİSLER

**Tanım 2.11 (Komşuluk Matrisi)**  $G = (V, E)$  graphında iki noktayı bağlayan bir kenar varsa bu iki noktaya **komşu** denir ve  $i \sim j$  ile gösterilir. Bir graphın komşuluk matrisi ise  $A(G)$  ile gösterilir ve


$$A(G) = \begin{cases} 1 ; i \sim j \text{ ise} \\ 0 ; \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

şeklinde tanımlanır.

Komşuluk matrisinde herbir satırın toplamı o noktanın derecesini verir. Ayrıca komşuluk matrisi simetriktir.

Örneğin;

$G = (V, E)$  graphı aşağıdaki gibidir.



Bu graphın komşuluk matrisi ise,

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur.



**Tanım 2.12 (Derece Matrisi)**  $G$  graphında herbir noktanın derecelerinin,

$$D = köş(d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n))$$

şeklinde yazılmasıyla oluşan bir köşegen matristir.

$$D(G) = [d_{ij}] = \begin{cases} d(v_i) & ; i = j \text{ ise} \\ 0 & ; \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

**Tanım 2.13 (Laplacian Matris)**  $G = (V, E)$  graphının Laplacian matrisi şöyle tanımlanır.

$$L(G) = \begin{cases} d(v_i) & ; i = j \text{ ise} \\ -1 & ; i \neq j \text{ ve } v_i \sim v_j \text{ ise} \\ 0 & ; \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$


Laplacian matrisin satır ve sütun toplamı 0 'dır. Laplacian matrisi simetrik bir matristir. Laplacian matris

$$L(G) = D(G) - A(G)$$

dir.

Örneğin;

$G = (V, E)$  graphını gözönüne alalım.




$G = (V, E)$  graphının Laplacian matrisi,

$$L(G) = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur.

**Tanım 2.14**  $A(G)$  komşuluk matrisinin en büyük özdeğerine *spektral yarıçap* denir ve  $\lambda(G)$  şeklinde gösterilir.

Aşağıdaki şekilde verilen  $G = (V, E)$  graphını gözönüne alalım.



Şekil 2.11: 6 noktalı graph örneği

$G$  graphının komşuluk matrisi;

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

şeklindedir. Özdeğerleri  $\lambda_1 = -2$ ,  $\lambda_2 = -1.7$ ,  $\lambda_3 = -0.32$ ,  $\lambda_4 = 0.27$ ,  $\lambda_5 = 0.8$ ,  $\lambda_6 = 2.9$  ve en büyük özdeğeri olan spektral yarıçapı  $\lambda = \lambda_6 = 2.9$  'dır.

**Tanım 2.15**  $L(G)$  Laplacian matrisin en büyük özdeğerine **Laplacian spektral yarıçap** denir ve  $\mu(G)$  şeklinde gösterilir.

Yukarıda şekil 2.11 deki  $G = (V, E)$  graphını ele alalım. Bu graphın Laplacian matrisi;

$$L(G) = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

şeklinindedir. Bu matrisin özdeğerleri  $\mu_1 = 0.49$ ,  $\mu_2 = 1.26$ ,  $\mu_3 = 2$ ,  $\mu_4 = 2.58$ ,  $\mu_5 = 4.73$ ,  $\mu_6 = 5.41$  ve Laplacian spektral yarıçapı ise  $\mu = \mu_6 = 5.41$  'dır. Maple 6 'da özdeğer hesabı ayrıntılı olarak Ek A'da verilmiştir.

## 2.4 BAZI CEBİRSEL YAPILAR

**Tanım 2.16**  $A$  boştan farklı bir küme olmak üzere  $* : A \times A \longrightarrow A$  dönüşümüne  $A$  da bir ikili işlem ve üzerinde ikili işlemin tanımlandığı bu  $A$  kümesine de cebirsel yapı denir ve  $(A, *)$  ile gösterilir.

**Tanım 2.17 (Grup)**  $(G, *)$  bir cebirsel yapı olsun. Eğer aşağıdaki şartlar sağlanırsa  $G$  'ye  $(*)$  işlemine göre) grup denir.

$G_1) \forall a, b \in G$  için  $a * b \in G$  (Kapalılık özelliği)

$G_2) \forall a, b, c \in G$  için  $a * (b * c) = (a * b) * c$  (Birleşme özelliği)

$G_3) \forall a \in G$  için  $a * e = e * a = a$  olacak şekilde vardır. (Birim elemanın varlığı)

$G_4) \forall a \in G$  için  $a * a' = a' * a = e$  olacak şekilde bir  $a' \in G$  vardır. (Ters elemanın varlığı)

**Tanım 2.18**  $(G, *)$  grubundaki  $*$  işlemi deęişmeli ise, yani  $\forall a, b \in G$  için  $a * b = b * a$  oluyorsa bu gruba **deęişmeli (Abel)** grup denir. Örneęin;  $(\mathbf{Z}, +)$  deęişmeli gruptur.

**Tanım 2.19 (Halka)**  $H$  boş olmayan bir küme ve  $H$  da toplama  $(+)$  ve çarpma  $(\cdot)$  denilen iki tane ikili işlem tanımlanmış olsun. Eğer  $(H, +, \cdot)$  cebirsel yapısı aşığıdaki şartları sağlıyorsa bu cebirsel yapıya halka denir.

$H_1)$   $(H, +)$  deęişmeli bir gruptur.

$H_2)$   $(H, +, \cdot)$  daki çarpma işlemi birleşme özelliğine sahiptir. Yani  $\forall a, b, c \in H$  için  $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$  dir.

$H_3)$   $(H, +, \cdot)$  cebirsel yapısı çarpma işlemine göre kapalıdır. Yani  $\forall a, b \in H$  için  $a \cdot b \in H$  dir.

$H_4)$   $(H, +, \cdot)$  daki çarpma, toplama üzerinde sağdan ve soldan dağılma özelliğine sahiptir. Yani  $\forall a, b, c \in H$  için  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$  ve  $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$  dir.

**Tanım 2.20**  $(H, +, \cdot)$  halkası eđer çarpma işlemine göre birime sahip ise, yani  $\forall a \in H$  için  $a \cdot 1_H = 1_H \cdot a = a$  olacak şekilde  $H$  da  $1_H$  ile gösterilen bir eleman varsa o zaman  $(H, +, \cdot)$  halkasına **birimli** halka denir.

**Tanım 2.21**  $(H, +, \cdot)$  halkası eđer çarpma işlemine göre deęişmeli ise, yani  $\forall a, b \in H$  için  $a \cdot b = b \cdot a$  oluyorsa,  $(H, +, \cdot)$  halkasına **deęişmeli** halka denir. Örneęin;  $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$  birimli ve deęişmeli bir halkadır.

**Tanım 2.22 (Cisim)** Birimli ve deęişmeli bir halkanın sıfırdan farklı her elemanının tersi mevcutsa bu halkaya cisim denir. Örneęin;  $(\mathbf{R}, +, \cdot)$  cisimdir.

## 2.5 MATRİS NORMU

$F$  bir cisim ve  $a_{ij} \in F$  olmak üzere  $A = (a_{ij})_{m \times n}$  matrisinin normu matrisin elemanlarının mutlak değerleri alınarak çeşitli şekillerde ifade edilebilir.

Matris normlarını aksiyoamlara bağlı olarak aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

**Tanım 2.23 [13]**  $M_n(F)$   $n \times n$  matrislerinin kümesini göstermek üzere,

$$M_N : M_n(F) \rightarrow \mathbf{R}^+$$

şeklinde tanımlanan dönüşüm aşağıdaki şartları sağlarsa o zaman bu dönüşüme **matris normu** denir ve normu  $A \in M_n(F)$  için  $M_N(A) = \|A\|$  şeklinde gösterilir.

- i*)  $A \in M_n(F)$  için  $A \neq 0$  ise  $\|A\| > 0$  ve  $A = 0 \Leftrightarrow \|A\| = 0$  dır.
- ii*)  $A \in M_n(F)$  ve  $\alpha \in F$  için  $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$  dır.
- iii*)  $A, B \in M_n(F)$  için  $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$  dır.
- iv*)  $A, B \in M_n(F)$  için  $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$  dır.

Eğer sadece *i*, *ii* ve *iii* aksiyomları sağlanırsa, o zaman bu norma genelleştirilmiş matris normu denir. Eğer *i*, *ii*, *iii* ve *iv* aksiyomlarının hepsi birden sağlanırsa buna da matris normu denir. Bu tanım aynı zamanda  $m \times n$  dikdörtgen matrisler için de geçerlidir.

### 2.5.1 Bazı Özel Normlar

$A = [a_{ij}]$ ;  $m \times n$  tipinde bir matris olmak üzere  $A$  matrisinin bazı normları şöyle tanımlanabilir.

$\ell_p$  normu:

$$\|A\|_p = \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^p \right)^{\frac{1}{p}}, (1 \leq p < \infty) \quad (2.1)$$

$p = \infty$  alınırsa,

$$\|A\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A\|_n = \max_{i,j} |a_{ij}| \quad (2.2)$$

**Frobenius(Euclide Normu):**

$$\|A\|_2 = \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.3)$$

**Spektral norm:**

$$\|A\|_S = \sqrt{\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|} \quad (2.4)$$

dır. Burada  $\lambda_i$ ,  $A^H A$  matrisinin özdeğerleridir,  $A^H$  ise  $A$  'nın eşlenik transpoze matrisidir.  $L$  Laplacian matrisi reel simetrik olduğundan  $\|A\|_L = \max |\lambda|$  dır.

**Satır uzunluk normu:**

$$r_1(A) = \max_i \sqrt{\sum_j |a_{ij}|^2} \quad (2.5)$$

**Sütun uzunluk normu:**

$$c_1(A) = \max_j \sqrt{\sum_i |a_{ij}|^2} \quad (2.6)$$

dır.

Normlar arasındaki bağıntıyı

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_2 \leq \|A\|_S \leq \|A\|_2 \quad (2.7)$$

şeklinde ifade edebiliriz.

## 2.6 HADAMARD ÇARPIMI

**Tanım 2.24 [8]**  $A = [a_{ij}]$  ve  $B = [b_{ij}]$ ,  $m \times n$  tipinde iki matris olmak üzere bu matrislerin Hadamard çarpımları  $A \circ B$  şeklinde gösterilir ve

$$A \circ B = (a_{ij}b_{ij})_{m \times n} \quad (2.8)$$

şeklinde ifade edilir.

**Örnek:**

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

matrislerinin Hadamard çarpımı

$$A \circ B = \begin{bmatrix} 6 & 12 & 1 \\ 20 & 0 & 4 \\ 15 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur.

Hadamard çarpımına genellikle Schur çarpımı da denir ve bu çarpım değişmelidir. Hadamard çarpımı daha ziyade matris teoride pozitif yarı definit matrisler için kullanılır. Yine pozitif yarı definit

matrisler ve negatif olmayan reel sayılar arasındaki bir benzerliği ortaya koyar.

## 2.7 MATRİS ÖZDEĞERİ

Bazı şartlar altında  $A$  bir  $n \times n$  kare matris ve  $x \neq 0$  bir  $n \times 1$  sütun vektörü olmak üzere, eğer  $Ax$  çarpımı  $\lambda x$  şeklinde ( $\lambda$ , herhangi bir skaler) yazılabilirse, o takdirde cebirde dikkate değer bir basitlik söz konusu olacaktır. Buna göre  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  matrisi ile  $x$ ,  $n \times 1$  vektörünün çarpımı sonucunda elde edilen vektörün orjinal vektöre paralel olduğunu kabul edelim. Yani

$$Ax = \lambda x$$

olsun.  $Ax = \lambda x$  denklemini  $I$ ,  $n \times n$  birim matris olmak üzere

$$(A - \lambda I)x = 0$$

şeklinde yazılabilir. Halbuki  $(A - \lambda I)x = 0$  denklemi  $n$  bilinmeyenli,  $n$  denklemden ibaret bir homojen lineer denklem sistemidir. Diğer taraftan bir homojen lineer denklem sisteminin aşıkâr olmayan çözümünün olması için katsayılar matrisinin tekil olması gerekir. Bundan dolayı  $(A - \lambda I)x = 0$  denklem sisteminin aşıkâr olmayan çözümü

$$\det(A - \lambda I) = |A - \lambda I| = 0$$

olması halinde mevcuttur.  $\det(A - \lambda I) = |A - \lambda I| = 0$  ifadesini aşağıdaki gibi açık şekilde yazabiliriz:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$\det(A - \lambda I)$  'nın hesaplanması sonucunda  $\lambda$  'ya bağlı  $n$ -inci dereceden monik bir polinom elde edilir. Bu polinoma  $A$  matrisinin karakteristik



polinomu denir ve  $K_A(\lambda)$  şeklinde gösterilir. Yani,

$$K_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

dır. Ayrıca  $K_A(\lambda) = 0$  denkleminde  $A$  matrisinin *karakteristik denklemi* denir. Bu karakteristik denklemin köklerine  $A$  matrisinin *özdeğerleri* (ya da karakteristik değerleri) denir. Hemen hatırlatalım ki;  $K_A(\lambda) = 0$   $n$ -inci dereceden bir denklem olduğundan cebirin esas teoreminden tam olarak  $n$  tane köke sahiptir. Bu köklerin hepsinin farklı olması gerekmez.

### 3 GRAPHIN SPEKTAL YARIÇAPI İLE İLGİLİ BAZI SINIRLAR

$G = (V, E)$  graphında  $m$  kenar,  $n$  nokta,  $\delta$  minimum derece,  $\Delta$  maksimum derece olmak üzere; aşağıdaki ifadeler geçerlidir.

**Lemma 3.1 [16]**  $G$ ;  $n$  noktalı  $m$  kenarlı graph olsun. Bu takdirde,

$$\mu(G) \leq \frac{-1}{2} + \sqrt{2m + \frac{1}{4}} \quad (3.1)$$

dır ve eşitliğin olması için ancak ve ancak  $G$  'nin bir komponentinde her bir nokta ya  $\delta$  dereceli ya da bütün diğer noktalara komşu olacak ve bütün diğer komponentleri  $\delta$  dereceli regüler olmasıdır.

**Lemma 3.2 [16]**  $G$ ;  $n$  noktalı  $m$  kenarlı bağlantılı bir graph olsun. Eğer  $G$  'nin izole noktası yoksa o zaman,

$$\mu(G) \leq \sqrt{2m - n + 1} \quad (3.2)$$

dir. Burada eşitliğin olması için ancak ve ancak  $G$  'nin bir komponentinin  $m$  kenarlı bir tam graph olması ve diğer bütün komponentlerinin izole noktalar olmasıdır.

**Teorem 3.3 [16]**  $G$  graphının noktalarının derece dizisi sırasıyla  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$  'dir ve  $\Delta = d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n = \delta \geq 1$  şeklindedir. Bu takdirde,

$$\mu(G) \leq d_n + \frac{1}{2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n d_i(d_i - d_n) + \left(d_n - \frac{1}{2}\right)^2} \quad (3.3)$$

dir. Eşitlik; ancak ve ancak  $G$  'nin en az iki parçalı komponente sahip bir regüler graph olması ya da bir star graph ve (mümkünse)  $K_2$ 'lerin ayrık birleşimi olması durumunda mümkündür.

**Teorem 3.4 [10]**  $G$ ;  $n$  noktalı  $m$  kenarlı basit bir graph olsun.  $G$  'nin minimum ve maksimum dereceleri, sırasıyla,  $\delta$  ve  $\Delta$  olsun.  $G$  'nin Laplacian matrisinin en büyük özdeğeri  $\mu(G)$  olmak üzere,

$$\mu(G) \leq \frac{(\Delta + \delta - 1) + \sqrt{(\Delta + \delta - 1)^2 + 4(4m - 2\delta(n - 1))}}{2} \quad (3.4)$$

dır. Ayrıca eğer  $G$  bağlantılı ise o halde eşitliğin sağlanması için ancak ve ancak  $G$  regüler ve iki parçalı graph olmalıdır.

**Teorem 3.5 [11]**  $G = (V, E)$  bir graph ve  $\mu(G)$ ,  $G$  'nin Laplacian matrisinin en büyük özdeğeri olmak üzere,

$$\mu(G) \leq \sqrt{2} \max \left( d(v)^2 + \sum_{u,v \in E} d(u) \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3.5)$$

dir. Ayrıca, eğer  $G$  bağlantılı ise o halde eşitliğin sağlanması için ancak ve ancak  $G$  iki parçalı ve  $\forall v \in V$  için  $d(v)^2 + \sum_{u,v \in E} d(u)$  aynıdır.

**Sonuç 3.6 [11]**  $G$ ;  $n$  noktalı  $m$  kenarlı ve izole noktası olmayan bir graph olsun.  $\Delta = \Delta(G)$  ve  $\delta = \delta(G)$  de sırasıyla minimum ve maksimum dereceler olmak üzere  $G$  'nin Laplacian matrisinin en büyük özdeğeri  $\mu(G)$  için bir üst sınır,

$$\mu(G) \leq [2\Delta^2 + 4m - 2\delta(n - 1) + 2\Delta(\delta - 1)]^{\frac{1}{2}} \quad (3.6)$$

dır. Üstelik  $G$  bağlantılı ise bu takdirde; eşitliğin olması için gerek ve yeter şart  $G$  regüler iki parçalı bir graph, özellikle  $G$  iki parçalı ise,

$$\mu(G) \geq [2\delta^2 + 4m - 2\Delta(n - 1) + 2\delta(\Delta - 1)]^{\frac{1}{2}} \quad (3.7)$$

dır. Üstelik  $G$  bağlantılı ise eşitlik olması için gerek ve yeter şart  $G$  'nin regüler olmasıdır.

**Teorem 3.7 [11]**  $G$ ;  $n$  noktalı  $m$  kenarlı ve iki parçalı bir graph  $\Delta = \Delta(G)$  ve  $\delta = \delta(G)$  de sırasıyla minimum ve maksimum dereceleri olmak üzere  $G$  'nin Laplacian matrisinin en büyük özdeğeri  $\mu(G)$  için bir üst sınır,

$$\mu(G) \leq \{\Delta + \delta - 1 - [(\Delta + \delta - 1)^2 + 8(2m - \Delta n + \Delta)]^{\frac{1}{2}}\}/2 \quad (3.8)$$

ve ya

$$\begin{aligned} & \{\Delta + \delta - 1 + [(\Delta + \delta - 1)^2 + 8(2m - \Delta n + \Delta)]^{\frac{1}{2}}\}/2 \\ & \leq \mu(G) \leq \{\Delta + \delta - 1 + [(\Delta + \delta - 1)^2 + 8(2m - \delta n + \delta)]^{\frac{1}{2}}\}/2 \end{aligned} \quad (3.9)$$

dir. Burada  $G$  bağlantılı ise 3.8 için kesin üst sınır ve  $G$  regüler ise 3.9 de eşitlik vardır.

**Teorem 3.8 [2]**  $G$  graphının noktalar kümesi  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  olmak üzere  $G$  'nin Laplacian matrisinin en büyük özdeğeri  $\mu$  için bir üst sınır,

$$\mu \leq \max\{d_i + d_j - |N_i \cap N_j| : 1 \leq i, j \leq n, v_i v_j \in E\} \quad (3.10)$$

dır. Burada  $d_i$ ,  $v_i$  noktasının derecesini,  $|N_i \cap N_j|$  de  $v_i$  ve  $v_j$  noktalarının ortak komşularının sayısını göstermektedir.

**Teorem 3.9 [3]**  $G$ , basit bağlantılı bir graph,  $\mu$  de  $G$  'nin Laplacian matrisinin en büyük özdeğeri olmak üzere  $\mu$  için bir üst sınır,

$$\mu(G) \leq \max \left\{ \left( d_u^2 + d_u + \sum_v \{d_u + d_v - |N_u \cap N_v| : uv \in E\} + \sum_v \{|N_u \cap N_v| : u \neq v, uv \notin E\} \right)^{\frac{1}{2}} : u \in V \right\} \quad (3.11)$$

dır.  $G$  iki parçalı graph ise eşitlik mevcuttur. Burada  $d_u$ ,  $u$  noktalarının derecesini,  $|N_u \cap N_v|$  de  $u$  ve  $v$  noktalarının ortak komşularının sayısını göstermektedir.

**Teorem 3.10 [3]**  $G = (V, E)$  graphının noktalar kümesi  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  olsun.  $G$  'nin Laplacian matrisinin en büyük özdeğeri için bir üst sınır,

$$\mu(G) \leq \max\{\sqrt{2(d_u^2 + d_u m'_u)} : v \in V\} \quad (3.12)$$

dir. Eşitlik olması ancak ve ancak  $G$  'nin iki parçalı regüler graph olması ile mümkündür. Burada

$$m'_u = \frac{\sum_v \{d_v - |N_u \cap N_v| : uv \in E\}}{d_u}$$

dir.  $d_u$ ,  $u$  noktalarının derecelerini,  $|N_u \cap N_v|$  de  $u$  ve  $v$  noktalarının ortak komşularının sayısını göstermektedir.

**Sonuç 3.11 [3]**  $G = (V, E)$ ,  $n$  noktalı  $e$  kenarlı basit bağlantılı bir graph olsun o zaman  $G$  'nin Laplacian matrisin en büyük özdeğeri

$$\mu(G) \leq \sqrt{2d_1^2 + 4e - 2d_n(n-1) + 2d_1(d_n - 1)} \quad (3.13)$$

dir. Burada eşitlik ancak ve ancak  $G$  'nin iki parçalı regüler graph olmasıyla mümkündür yine burada  $d_1$  maksimum derece,  $d_n$  minimum derece,  $e$  kenar sayısıdır.

**Teorem 3.12 [3]**  $G = (V, E)$ , bağlantılı bir graph olsun. Bu takdirde  $G$  'nin Laplacian matrisinin özdeğeri için bir üst sınır,

$$\mu(G) \leq \max \left\{ \frac{(d_u + d_v) + \sqrt{(d_u - d_v)^2 + 4m_u m_v}}{2} : uv \in E \right\} \quad (3.14)$$

dir. Eşitlik ancak ve ancak  $G$  'nin ya iki parçalı düzenli graph ya da iki parçalı yarı düzenli graph olması durumunda mümkündür.  $d_u$  ve  $m_u$  sırasıyla  $u$  noktasının derecesini ve  $u$  'ya komşu noktaların derecelerinin ortalamasıdır.

**Teorem 3.13 [4]**  $G$  en az bir kenarlı basit graph olsun. Bu durumda,

$$\mu(G) \geq \max \left\{ \left( (d_i^2 + 2d_i - 2d_j - 2 + ((d_i^2 + 2d_i + 2d_j + 4)^2 + 4(d_i - c_{ij} - 1)(d_j - c_{ij} - 1))^{\frac{1}{2}}) / 2 \right)^{\frac{1}{2}} : v_i v_j \in E \right\} (3.15)$$

dir. Burada  $d_i$  ve  $d_j$  sırasıyla  $v_i$  ve  $v_j$  noktalarının derecelerini,  $c_i$  ise  $v_i$  ve  $v_j$  noktalarının ortak komşuluklarının sayısını göstermektedir.

## 4 NORMLAR YARDIMIYLA LAPLACIAN SPECTRAL YARIÇAPA SINIRLAR

Bu bölümde bir graphın Laplacian matrisini Hadamard çarpımından yararlanarak iki matrisin çarpımı şeklinde yazmaya çalışacağız. Ayrıca bu matrislerin satır ve sütun normlarından yararlanarak Laplacian spektral yarıçapı için bir sınır bulmaya çalışacağız.

**Lemma 4.1 [8]** Eğer  $A = [a_{ij}]$ ,  $B = [b_{ij}]$  ve  $C = [c_{ij}]$ ,  $m \times n$  tipinde matrisler ve  $C = A \circ B$  ise bu takdirde,

$$\|C\|_2 \leq r_i(A)c_i(B) \quad (4.1)$$

dir.

**Lemma 4.2 [8]**  $A = [a_{ij}]$ ,  $m \times n$  matris ve  $\lambda$ ,  $A$ 'nın spektral yarıçapı ise

$$\lambda \leq \|A\|_2 \quad (4.2)$$

dir.

**Teorem 4.3**  $L(G)$ ,  $G$  graphının Laplacian matrisi ve  $\mu$  Laplacian spektral yarıçap olmak üzere,

$$\mu \leq \sqrt{\frac{d_1^3}{4} + 2d_1^2 + 4d_1} \quad (4.3)$$

dir. Burada  $d_1$  maksimum derecedir.

**İspat.**  $A$  ve  $B$  matrislerini;

$$A = \begin{cases} 2 & ; i = j \text{ ise} \\ -1 & ; i \sim j \text{ ise} \\ 0 & ; \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

$$B = \begin{cases} \frac{d_i}{2} ; i = j \text{ ise} \\ 1 ; i \sim j \text{ ise} \\ 0 ; \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

şeklinde tanımlarsak  $A \circ B = L$  olur. Ayrıca;

$$r_1(A) = \max_i \sqrt{\sum_j |a_{ij}|^2} = \max_i \sqrt{4 + d_i} = \sqrt{4 + d_1}$$

$$c_1(A) = \max_j \sqrt{\sum_i |a_{ij}|^2} = \max_j \sqrt{\frac{d_i^2}{4} + d_i} = \sqrt{\frac{d_1^2}{4} + d_1}$$

Ayrıca  $A$ ,  $B$  ve  $L$  matrisleri  $G$  graphı, basit ve bağlantılı olduğunda simetrik matrisler olduklarından satır ve sütun normları eşittir.

$$r_1(A) = c_1(A) = \sqrt{4 + d_1}$$

$$c_1(B) = r_1(B) = \sqrt{\frac{d_1^2}{4} + d_1}$$

$L = A \circ B$  ve

$$\begin{aligned} \mu &\leq r_1(A)c_1(B) \\ &\leq \left(\sqrt{4 + d_1}\right) \left(\sqrt{\frac{d_1^2}{4} + d_1}\right) \\ &\leq \sqrt{(4 + d_1) \left(\frac{d_1^2}{4} + d_1\right)} \\ &\leq \sqrt{\frac{d_1^3}{4} + 2d_1^2 + 4d_1} \end{aligned}$$

dır. ■



**Teorem 4.4**  $L(G)$ ;  $G$  graphının Laplacian matrisi ve  $\mu$ , Laplacian spektral yarıçap olmak üzere,

$$\mu \geq \sqrt{\frac{d_n^3}{4} + 2d_n + 4d_n} \quad (4.4)$$

dır. Burada  $d_n$  minimum derecedir.

**İspat.**  $A$  ve  $B$  matrislerini Teorem 4.3 deki şekilde seçelim.

$$r'_1(A) = \min_i \sqrt{\sum_j |a_{ij}|^2} = \min_i \sqrt{4 + d_i} = \sqrt{4 + d_n}$$

$$c'_1(B) = \min_j \sqrt{\sum_i |a_{ij}|^2} = \min_j \sqrt{\frac{d_j^2}{4} + d_j} = \sqrt{\frac{d_n^2}{4} + d_n}$$

olarak ifade edebiliriz.

$L = A \circ B$  olduğundan özdeğer ve norm arasındaki bağıntıdan

$$\mu \geq r'_1(A) \cdot c'_1(B)$$


$$\mu \geq \left( \sqrt{4 + d_n} \right) \left( \sqrt{\frac{d_n^2}{4} + d_n} \right)$$

$$\mu \geq \sqrt{\frac{d_n^3}{4} + 2d_n^2 + 4d_n}$$

alt sınırlarını buluruz. ■

## 5 ÖRNEKLER

### Örnek 5.1




$$L(G) = A \circ B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mu$	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.10)	(3.11)	(3.12)	(3.14)	(4.3)
5	6.216	6.472	6.928	5	6.708	6.324	5	8

$\mu$	(3.15)	(4.4)
5	5	2.5

## Örnek 5.2




$$\begin{aligned}
 L(G) = A \circ B &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$\mu$	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.10)	(3.11)	(3.12)	(3.14)	(4.3)
3.41	3.56	3.645	3.741	4	3.872	3.741	3.5	4.242

$\mu$	(3.15)	(4.4)
3.41	3.316	2.5

### Örnek 5.3




$$\begin{aligned}
 L(G) = A \circ B &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$\mu$	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.10)	(3.11)	(3.12)	(3.14)	(4.3)
4.56	5.274	5.531	5.291	5	5.656	5.477	4.791	6.062

$\mu$	(3.15)	(4.4)
4.56	4	2.5

### Örnek 5.4




$$\begin{aligned}
 L(G) = A \circ B &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$\mu$	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.10)	(3.11)	(3.12)	(3.14)	(4.3)
4	4.701	5	5.291	4	4.242	4.898	5.049	6.062

$\mu$	(3.15)	(4.4)
4	4	2.5

### Örnek 5.5



$$L(G) = A \circ B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$\mu$	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.8)	(3.10)	(3.11)	(3.12)	(3.14)	(4.3)
4.481	5	5.274	5.291	5.274	5	5.291	5.291	4.601	6.062

$\mu$	(3.15)	(4.4)
4.481	4.0108	2.5

## KAYNAKLAR

- [1] Balakrishnan R.; Ranganathan K., *A Textbook of Graph Theory*, Springer, **2000**
- [2] Das, K.C; *An improved upper bound for Laplacian graph eigenvalues*, *Linear Algebra and its Applications*, Elsevier, **2003**, 368, 269-278
- [3] Das, K.Ch; *A characterization on graph which achieve the upper bound for the largest Laplacian eigenvalue of graphs*, *Linear Algebra and its Applications*, Elsevier, **2004**, 376, 173-186
- [4] Das, K.Ch; *The largest two Laplacian eigenvalues of a graph*, *Linear and Multilinear Algebra*, **2004**, 52(6), 441-460
- [5] Diestel, R.; *Graph Theory*, Springer, **2006**
- [6] Gross J.L.; Yellen J., *Graph Theory and its Applications*, CRC Press, **2006**
- [7] Hong, Y.; Shu, L-J, Fang, K. , *A Sharp upper bound of the spectral radius of graphs*, *Journal of Combinatorial Theory, Series B* **2001**, 81, 177-183
- [8] Horn, R.A.; Johnson C.R., *Matrix Analysis*, Cambridge University Press, **1985**
- [9] Lin, L.; *The Laplacian spectral radius of graphs on surfaces*, *Linear Algebra and its Applications*, Elsevier, **2008**, 428, 973-977
- [10] Liu, H.; Lu M.; Tian F., *On the Laplacian spectral radius of graph*, *Linear Algebra and its Applications*, Elsevier, **2004**, 376, 135-141
- [11] Shi, L.; *Bound on the (Laplacian) spectral radius of graphs*, *Linear Algebra and its Applications*, Elsevier, **2007**, 422, 755-770

- [12] Shu, J-L.; Hong Y.; Wen-Ren K., *A sharp upper bound on the largest eigenvalue of the Laplacian matrix of a graph*, *Linear Algebra and its Applications*, Elsevier, **2002**, 347, 123-129
- [13] Taşçı D., *Lineer Cebir*, Ankara, **2011**
- [14] Tian G-X ; Huang T-Z ; Zhou B.; *A note on sum of powers of the Laplacian eigenvalues of bipartite graphs*, *Linear Algebra and its Applications*, Elsevier, **2009**, 430, 2503-2510
- [15] Tutte W.T.; *Graph Theory*, Cambridge University Press, **2001**
- [16] Zhou B.; Cho H.H.; Guangzhou, *Remarks on Spectral Radius and Laplacian Eigenvalues of a graph*, *Czechoslovak Mathematical Journal*, **2005**, 55(130), 781-790



# EK-A

```

Maple 6 - [Untitled (1)]
File Edit View Insert Format Spreadsheet Options Window Help
[Icons]
x (f) !
> with(linalg);
Warning, the protected names norm and trace have been redefined and unprotected

[BlockDiagonal, GramSchmidt, JordanBlock, LUdecomp, QRdecomp, Wronskian, addcol, addrow,
adj, adjoint, angle, augment, backsub, band, basis, bezout, blockmatrix, charmat, charpoly,
cholesky, col, coldim, colspace, colspan, companion, concat, cond, copyinto, crossprod, curl,
definite, delcols, delrows, det, diag, diverge, dotprod, eigenvals, eigenvalues, eigenvectors,
eigenvects, entermatrix, equal, exponential, extend, ffgausselim, fibonacci, forwardsub, frobenius,
gausselim, gaussjord, geneqns, genmatrix, grad, hadamard, hermite, hessian, hilbert, htranspose,
ihermite, indexfunc, innerprod, intbasis, inverse, ismith, issimilar, iszero, jacobian, jordan, kernel,
laplacian, leastsqrs, linsolve, matadd, matrix, minor, minpoly, mulcol, mulrow, multiply, norm,
normalize, nullspace, orthog, permanent, pivot, potential, randmatrix, randvector, rank, ratform,
row, rowdim, rowspace, rowspan, rref, scalarmul, singularvals, smith, stackmatrix, submatrix,
subvector, subbasis, swapcol, swaprow, sylvester, toeplitz, trace, transpose, vandermonde,
vecpotent, vectdim, vector, wronskian]
> L:=matrix(6,6,[4,-1,0,-1,-1,-1,-1,4,-1,-1,0,-1,0,-1,2,0,-1,0,-1
,-1,0,2,0,0,-1,0,-1,0,2,0,-1,-1,0,0,0,2.]);
L :=
      4  -1  0  -1  -1  -1
     -1  4  -1  -1  0  -1
      0  -1  2  0  -1  0
     -1  -1  0  2  0  0
     -1  0  -1  0  2  0
     -1  -1  0  0  0  2.

> eigenvals(L);
.4951589269 10-13, 1.267949192, 2.000000000, 2.585786438, 4.732050808, 5.414213562
[> |
Time: 1.0s Bytes: 2.94M Available: 2.00G

```

## ÖZGEÇMİŞ

06-04-1978 yılında Aksaray ili İncesu kasabasında doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve lise tahsilini kasabasında tamamladı. 1994 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü kazandı. 1998 yılında mezun olarak aynı yıl Kırşehir ili Boztepe ilçesi Gazi Osman Öztürk İlköğretim okuluna atandı. Daha sonra 2003 yılında Kırşehir Merkez 23 Nisan İlköğretim okuluna ardından 2007 yılında Sıddık Demir Anadolu lisesine tayin oldu ve halen aynı okulda çalışmaktadır. 2009 yılında Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde Yüksek lisans eğitimine başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.