



4 ULUSAL AHI EVRAN TIP ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

22 Mayıs 2021

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

tipogrsempozyum.ahievran.edu.tr

İletişim: 0535 547 53 73 - 0505 478 05 52

E-posta: tipogrencisempozyumu@ahievran.edu.tr



 **aeutipsempozyum**



4. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu
Program & Özet Bildiri Kitapçığı
22 Mayıs 2021



4. Ulusal Ahi Evran Tıp
Öğrenci Sempozyumu 2021
&
Bildiri Kitapçığı
&
Sempozyum Programı



Copyright © 22 Mayıs 2021 4. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu, Kırşehir Türkiye

İLETİŞİM

Adres: Bağbaşı Mah. Şehit Necdet Yağız Caddesi No:143/E, Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Merkez/KIRŞEHİR (MERKEZ YERLEŞKE)

Tel: Beyza Nur DEMİR - 0505 478 05 52
Betül SULUBULUT - 0535 547 53 73

Web: <https://tipogrsempozyum.ahievran.edu.tr/>

e-Posta: tipogrencisempozyumu@ahievran.edu.tr

3

Sosyal Medya: [instagram/aeutipsempozyum](https://www.instagram.com/aeutipsempozyum)

Sempozyum : Kırşehir Ahi Evran Üniversitemiz Tıp Fakültesi Toplantı salonunda YouTube canlı yayın sistemi ile ve AYDEP alt yapısı kullanarak çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

--KAEÜ TV; youtube kanalında,

--vds.ahievran.edu.tr (vds linkleri sempozyumdan önce paylaşılacaktır)



Geleceğin hekimleri olarak; Ahiliğin evrensel prensipleriyle yetişerek, iyi bir hekimin tıbbi bilgi ve beceri edinmesinin yanı sıra yüksek ahlaki değer ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği bilinciyle eğitim hayatlarını sürdüren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak, her sene olduğu gibi bu sene de geleneksel "Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu" nu düzenlemekteyiz. Sempozyumumuzda gerek farklı üniversiteler gerekse üniversitemiz tıp fakültesi öğrencileri hazırlamış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma grubu çalışmalarını aktarma fırsatını bulacak, mesleki bilgi ve birikimlerimizin aktarımı sağlanacaktır.

Kıymetli Hocalarımız ve Meslektaşlarımız, bu sene Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri olarak düzenleyeceğimiz dördüncü ulusal tıp sempozyumumuza sizleri davet ediyor olmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyuyoruz.

Bu yılki sempozyumumuzda da ortak fikirler, aylar süren emek ve çabayla sizlere bilimsel ve sosyal açıdan zengin bir ziyafet sunmayı planlıyoruz.

Birbirinden kıymetli hocalarımız ile birlikte bu yıl da beraber öğrenmenin, beraber üretmenin, beraber çözüm bulmanın, beraber eğlenmenin tadına varmak ve emeği paylaşmak için 22 Mayıs 2021 tarihlerinde Kırşehir’de 4. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumuna bekliyoruz.

Biz hazırız, Ya siz?
Saygılarımızla

Kongre Başkanları

Ayşe DİRİCAN

Betül SULUBULUT

Beyza Nur DEMİR



“Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” sözüyle meşhur olan Ahi Evran-ı Veli çalışmayı, aklı, bilimi, kaliteyi, sabrı ve ahlakı öne çıkararak “hayırda yarışmayı” esas almıştır. Ahilik, medeniyetimizin insanlığa sunduğu “eşyaya teslim olmayan bir ahlak ve kardeşlik” projesidir. Bu değerler günümüzde ne kadar unutulsa da bizim medeniyetimizin değerleridir. Bu değerleri yeniden yeşertmek te bizim görevimizdir. Bir tıp eğitim kurumu olarak en önemli hedefimiz çağdaş tıp eğitim yöntemleri yanında medeniyetimizin değerlerine Tıp Eğitimimizde yer vererek, Ahi Evran-ı Veli’nin diyarına yakışır bir Meslek Ahlakına sahip, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan ve tüm insanlığın faydasına hizmet üreten, bilim üreten Hikmetli Hekimler, Ahi Hekimler yetiştirebilmektir.

Sempozyumun başarılı geçmesini diler ve emeği geçen tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunarım.

Prof.Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
Kongre Onursal Başkanı



KOMİTELER VE BİLİMSEL KURULLAR

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Kongre Danışma Kurulu

Prof. Dr. Muttalip ÇİÇEK

Doç. Dr. Ali GÜNEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cihan YAVAŞ

Arş. Gör. Ferhat PEKTAŞ

Arş. Gör. Burcu KAMAŞAK

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Muttalip ÇİÇEK

Prof. Dr. M. Gökhan GÖZEL

Prof. Dr. Elif SEVİM

Prof. Dr. Kemal ÖRNEK

Prof. Dr. Gökçe ŞİMŞEK

Doç. Dr. Ali GÜNEŞ

Doç. Dr. Ziya ASAN

Dr. Öğr. Üyesi Hilal AKALIN

Dr. Öğr. Üyesi Alican BİLDEN

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIRAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cihan YAVAŞ

Arş. Gör. Ferhat PEKTAŞ

Arş. Gör. Burcu KAMAŞAK

Kongre Başkanları

Ayşe DİRİCAN

Betül SULUBULUT

Beyza NUR DEMİR

Düzenleme Kurulu

Ayşe DİRİCAN Dönem 2

Betül SULUBULUT Dönem 4

Beyza Nur AYDIN Dönem 1

Beyza Nur DEMİR Dönem 4

Beyza ŞAHAN Dönem 3

Emre AKAR Dönem 3

Esmâ ASLAN Dönem 2

Hüdanur İNCE Dönem 3

Kevser KILIÇLAR Dönem 1

Menduha ŞAHİN Dönem 2

Ömürcahan AYDIN Dönem 1

Sümeyra ASLAN Dönem 3

Sümeyye KARADOĞAN Dönem 5



Araştırma projeleri		
Sözlü Sunum No	Bildiri Konusu/Yazarlar	Sayfa
1	COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİ VE ÖNCESİNDE SAĞLIKTA ŞİDDET Güneş KÜÇÜK, Eylül Ece KILIÇLI, Selcan TAY, Esmâ Berivan SELÇUKOĞLU, <u>Ömürcahan Sadettin AYDIN</u> , Mustafa AĞCA, Ayetullah TUNCEL, Burak Emre ASLAN, Reşit KAVAKLI, İbrahim EROĞLU	15
2	ACİL SERVİSE BAŞVURAN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARDA HEMOGLOBİN VE ÜRE DÜZEYİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ Muhammet Furkan BEKMEZ, Abdullah Gürkan ACAR, Yunus Ömer ŞAHİN, Buse BAYDEMİR, Ahmet Kemal UYGUN, Mehmet ORHAN, Betül KAÇMAZ, <u>CANSEL YILDIRIM</u> , Sercan EROĞLU	16
3	COVID 19 GEÇİREN ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ <u>Kerem AKIN</u> , Ziyet YILMAZ, Hale ALTUNER, Ecrin ÖZDEMİR, Buse TÜRKMEN, Emirkan YILDIZ, İremnur SÜME, Yusuf Ziya ÖZGÜLTEKİN, Ramazan DULKADİR	17
4	TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE DERS ÇALIŞMA SAATLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Enes KOÇ*, <u>Muhammed Emir SÜMER</u> , Sefa BADEM, İsmail BÖREKÇİ, Melihcan YAĞMUR, Ceyda Gül Hifa BAYHAN, Aslıhan TÜYSÜZ, Sümeyra ASLAN, Nazlı Nur ALTUN	18
5	GERİATRİK KALÇA KIRIĞI HASTALARINDA CERRAHİ TEDAVİ ALAN VE ALMAYANLARIN 1 YILLIK MORTALİTE ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI <u>Beyza ŞAHAN</u> , Merve GÜNER, Bilal AKYOL, Ece KAPLAN, Halil İbrahim KÖZOĞLU, Engin YAPICI, Ahmet Koray KARAIŞLI, Havva Nur TÜRKÖĞLU, Hakkı Çağdaş BASAT	19
6	ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA TELEFON TAKİP SİSTEMİNİN EGZERSİZ TEDAVİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ezgi Feyza AYDIN Furkan Ali UÇAR <u>Beyza Nur KARTAL</u> Sare YILMAZ Şevval Beyza ÇELİK Batuhan ŞAHİN Umut GÜNTEMUR Mualla ÖZSÖZ	20
7	OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN TÜRK POPULASYONUNDA GPX1 Pro198Leu ve MnSOD Ala16Val ANTİOKSİDAN ENZİM GEN POLİMORFİZMLERİ VAR MI? Harun SOYALIÇ, <u>Eren SERİN</u> , Ceren ÖZDAĞ, Bedriye Rumeysa YUMUŞAK, İdil KOCA, Furkan SARIYILDIZ, Selin SAKALLI, Ayşenur Zehra YILMAZ, Hasan Hüseyin DEMİR, Mert EFE, Mehmet Ali AKGÜN	21
8	COVID-19 GEÇİREN BİREYLERİN HASTALIK SONRASI KORUNMAYA YÖNELİK TEDBİRLERE UYMA DURUMU Nazlı ÇELİK, Melisa GÜLER, Ercan KOZAN, <u>Serife Nur AKYÜREK</u> , Nihal BAYRAKTAR, Berivan HAYKIR, Mustafa ORDU, Kübra YILDIZ, Furkan DOĞAN, Buse ACIGÖZ	22
9	DÜNYA TARİHİNDEKİ BÜYÜK SALGINLAR Demir E, Zeytun E, Yıldız E, Donat H, <u>DEMİR İ</u> , Sarıkaya N, Ayoub Z, Sarı Z.	23
10	BİREYLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KORKU DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	24



	Dilek KUZAY AKSOY, Beste DAYAN, Hüdanur AKKÖZE, Osman Mert YILDIZ , Zeynep IŞIK, Can Erce ŞAHİNKUŞ, Emine AYGİN, Rukiye BÜYÜKDEVECİ, Mehmet Furkan AKGÜN	
11	AİLE HEKİMLERİNİN KOAH TANI VE TEDAVİSİNE YAKLAŞIMLARININ ARAŞTIRILMASI: KIRŞEHİR İL ÖLÇEĞİ Büşra AKPINAR , İrem KESER, Çiğdem ATLI, Elif Esin BAKIN, Esranur KAĞITLI, Hilal BAYRAKTAR, Hüdanur İNCE, Muhammed Furkan ÖZ, Nazlı BİLEN, Berat Boran KURNAZ, Mehmet Cihan YAVAŞ	25
12	COVID-19 PANDEMİSİ VE AŞILARA DAİR TUTUMLARIN İNCELENMESİ Medine Rana KARATEKELİ , Beyza Gül AMANET, Metin ŞİREÇİ, Güneş BAYRAM, Öznur ÖZ, İlayda Elif KARCIOĞLU, Ahmet Erdem ESKİN, Hasan ER, Seda KANDEMİR, Mehmet Sait	26
13	ACİL SERVİSE MÜRACAAT EDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Osman BEKTAŞ, Berfin Elif KARAMAN , Gülgüşa BUCAK, Beria Binnaz KUZU, Huriye Hümeysra DURAN, Şeyma KARAOSMANOĞLU, Yeliz BAKIR, Çağrı AKCAN, Onur BURGUCU, Hacı Mehmet ÇALIŞKAN	27
14	COVID-19 PANDEMİSİNİN BESLENME VE HAREKET ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Ahmet Salih CEYLAN , Feyza SERT, Aslı İnsal, Elfin Sueda Çoban, Aslı Karabulut, Ali Rıza Kazel, Zeynep Belemir Baltacı, Makhmud Makhmudov, Bekir BULUT	28
15	TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CORONAVİRUS HAKKINDAKİ FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Zehranur Dağdelen , Hüma Münteha Erdoğan, Yiğit Alp Yaşın, Esra Öz, Keziban Tuğba Toprak, İlayda Sancak, Gülay Dursun, Esra Şanlı, Kağan Tur	29
16	COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ ANALİZİ Ali Rıza PAYAM, Barış YAKUT, Fatih YILDIRIM, Gözde ATEŞ , Müzeyyen Gizem PARMAK, Sena Melis ERKAL, Seyit PINARBAŞI, Betül SULUBULUT, Süleyman GÜLDAĞI, İrem MERTOĞLU, Batuhan BOZKURT, Mustafa KARA, Barış ÇIPLAK	30
17	ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HPV VE HPV AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ Sümeyye KIŞLALI, Deniz ERİM, Muhammed SUNGUR, Ömer Faruk YURDAKUL, Mücahit Cafer DOKUMACI, Zeynep Rumeysa CANDEMİR, Senol ÇAKIR , Mustafa TEKİN Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU Barış ÇIPLAK	31
18	KAEÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Esmâ GÜZELOĞLU , Deniz SENTÜRK , Nezaket DEMİRDELEN, Derya ÜNLÜTÜRK, Yeşim ÖZ, Emine Betül TUFAN, Esmâ Hüsne TORUN, Ahmet Selim DUYGU, Naime Meriç KONAR	32
19	TIP FAKÜLTESİNDE OKUYAN VE OKUMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Mustafa ÇELİK, Oğuz Furkan TETİK, Burak BUZ, Mehmet ÖZKAN, Üzlifet KURNAZ, Oğulcan SORHAN, Hamit YILMAZ, Ravza GÖLEÇ, Aybüke Gizem ÇAKIN , Nuray ALBAR, Berkan TÜLEK	33
20	COVID 19 DÖNEMİNDE PANDEMİ ACİL POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERİN LABORATUVAR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüseyin Mert YÜKSEL , Beyza BAYRAKDAR, Burak Ali ÖZDEMİR, Ayşe KAMACI, Sibel UÇUCU, Hakan Koray SÖĞÜT, Ali Barış ÜSTÜNDAĞ, Merve BAĞ, Barış ÇIPLAK, Eyüp Gökhan TURMUŞ	34
21	COVID-19 GEÇİREN KİŞİLERDE EREKTİL DİSFONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNÇALIŞMA Erol Erşekerci, Beyza Nur AVARA , Esra Yetimova, Alperen Güneş, Beyza Nur Aydın, Sıla Yaren Erdoğan, Yunus Emre Bağcı, Hakan Bilçen, M.Şahin Bağbancı, İbrahim Üntan	35



22	ŞİZOFRENİDE İNTİHAR İÇİN RİSK OLUŞTURAN KAN PARAMETRELERİ Bilal İLANBEY, <u>Emine DEMİR</u> , Merve Nurten LÜLE, Emre AKAR, Beyza AKALIN, Nilay AÇACAK, Meriç KAVUTÇU, Ahmet GÜNAYDIN, Ramazan YILDIRIM, Büşra EKİCİ	36
23	AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA DUYGUDURUMUN VE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ <u>Sedanur GEDİKBAŞ</u> , Ramazan AYAN, Elif IŞIK, Esra Nur KARATAY, Raziye AKIN, Yusuf ÇİFTÇİ, Asuman ÇELİKBİLEK	37
24	HİPOKAMPAL-ASTROGLİAL HÜCRELERDE 4-AMİNOPİRİDİN KAYNAKLI İN VİTRO EPİLEPSİ MODELİNDE GLUTAMAT EKSİTOTOKSİSİTESİ VE TRPC1 KATYON KANALLARI ÜZERİNE HİPERİSİN VE KURKUMİNİN ETKİLERİNİN MOLEKÜLER TEKNİKLERLE İNCELENMESİ Bilal ÇİĞ, Ekin ÇELİK, G. Sanem SARIBAŞ, Dilek KUZAY, S. Ata AYDIN , E. Batuhan AKÇALI, Hilal EROĞLU, B. Hasan KAYA, Ş. Berkay AZGİNOĞLU, Emir GÖKTÜRK, Ümrhan AYDEMİR, Nihan YILMAZ, Caner GÜNAYDIN	38
25	COVİT19 ENFEKSİYONU GEÇİREN KOKU VE TAT SEMPTOMU OLAN HASTALARIN TESBİTİ VE ÖNEMİ Mustafa AVCU, Fatma YENER, Yasemin İLVAN, Uğurcan KATKICI, Muhammed UĞUR AL, Büşra UZAKGİDER, Cumali Furkan BOZKURT, <u>Baran ÖZBAS</u> , Sadike KANKURAL	39
26	POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLARIN ÖNGÖRÜLMESİNDE BELİRTEÇ KARŞILAŞTIRILMASI; ASA VE ARİSCAT Zeynel Abidin ERBESLER, Ahmet TAŞ, Hatice KORU, Şevket ŞENYURT, <u>Betül KALAFAT</u> , İrem ELİAÇIK, Alperen ERDURAN, Sultan ŞAHAN, Betül BALLI, Sıla Nur ŞEHNAZ	40
27	PRİMER KORONER ANJİOGRAFİ YAPILAN HASTALARDA NEFROPATİ GELİŞİMİ Recep DEMİRİ, Elif Nur BAYKAL, Ata ARSLAN, Zehra Nur ERKAN, Ahmet ESEN, Bekir Sami ALPAY, <u>Dilara AKGÜL</u> , Sefra KAPLAN, Kübra DEMİRBAĞ, Enis Elvan SAKALLIOĞLU, Alp YILDIRIM	41
28	TÜRKİYE'DE 2020 YILINDA COVID-19 VE ETKİLERİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ULUSAL TIBBİ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ Alperen DEDEOĞLU, Yener ÇAKIR, Beyza Nur DEMİR, Beyza Nur ERSOY, Feyza ERTÜRK, Saithan KOCAOĞLU, Batuhan KÖYBAŞI, Melih SÖYLEMEZ, Esra TANRIVERDİ, <u>Ezgi YAĞRINCALI</u> , Ömer Faruk ELMAS	42
29	AKCİĞER VE BATIN GRAFİSİ ÇEKTİRMİŞ ADÖLESANLARDA SKOLYOZ PREVELANSI Samet Sancar KAYA, Bilal ŞAŞMAZ, <u>Ercüment CERAN</u> , Fatima BAYDAR, Aleyna TEKELİ, Gamze GÜZEŞ, Zişan TAŞ, Abdulkadir ASLAN	43
30	COVID-19 PANDEMİSİNİN DİSTAL RADIUS KIRIĞI TEDAVİSİNE ETKİSİ <u>Beyza HALAÇ</u> , Kevser KILIÇLAR, Aysel KESKİN, Songül ERDUMAN, Emre DUMAN, Fevzi YİĞİT, Muhammet Salih DEMİRKOL, Zafer Yağız VANLI, Kübra UNKUN, Levent HOROZ	44
31		45
32		46
33		47



Sosyal sorumluluk projeleri		
Sözlü Sunum No	Bildiri Konusu/Yazarlar	Sayfa
1	BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI <u>Sena SAVASCI</u> , Şerife KALEM, Koray OKUMUŞLAR, Enes Buğra BOZER, Begüm YILMAZ, Ayşenur SUNA, Tuna KIRAC, Kutay ÜSTÜN, Aybüke YILMAZ, ElifNur ACIBAL, Mert Furkan DAL Danışman: Mehmet Fatih Alpay	49
2	“AŞILAR HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?” Gülhan ÜNLÜ, Deniz TOPRAK, Gülşenem ÇETİN, <u>İlayda ALTINTAS</u> , Nivin ABDO, Onur KÜÇÜKCANKURTARAN*, Ömer ÇOBANOĞLU*, Ömer Erdem ŞENTÜRK*, Sena Begüm BAŞYİĞİT	50
3	SESİM GELİYOR MU? (Acil Sağlık Hizmetlerine Erişim) <u>Sude CAM</u> , Abdullah SOYDAN, Defne YENİ, Burak KURTLUCAN, Gizem DAMAR, Emre CENGİZ, Macide YILMAZ, Oğuzhan KOLAY, Sinem GÜLTEKİN, Sina ASADZADEH, Tala AKBARIASANJAN	51
4	ÖĞRENCİLERDE POSTÜR BOZUKLUKLARINA KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ Ahmet YILMAZ, Ayşenur KARATAŞ, Beyza Nur VARGÜN, İrem ÖZ, İsmail AŞIKHASAN, Mehmet KARAKUŞ, <u>Samet İNANICI</u> , Şerife Nur DEVECİ, Zülküf Semih ADA	52
5	FARKINDALIĞA YOLCULUK Anıl ÖZÜDOĞRU, Ayşen İYİLİ, Duygu Asena ERDOĞAN, Ecem ERCİYES, Feride Hüda EKİNCİ, Furkan BARUT, <u>Furkan Buğra ALKAN</u> , Hatice Kübra ÇINKIR, Hikmet Enes UYAR, Hüsnâ Betül MANGAN, Nisa Deniz KARLIK, Şengül ELBİR	53
6	KİŞİSEL HİJYEN EĞİTİMİ <u>Damla ASLAN</u> , Beyza Sena SATIRLI, Betül FİDAN, Esmâ ASLAN, Sara ÖZKÜLEKÇİ, Şevket Emre KARAMANCI, Elif Süeda TENGİZLER, Güneş Dinç AKBULUT	54
7	GIDA TERÖRÜ Süleyman ERSOY, Sedanur ÖZGÜL, <u>Buket ORHAN</u> , <u>Simge ÖZDEMİR</u> , Rümeyşa GÜNER, Batuhan BAŞ, Fidan YILDIZ, Şeyma ÇITAK, Mahra Dilara KARAKAŞ, Raziye Nur TAŞDÖVEN	55
8	DOKU VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA KİTLELERİN BİLGİLENDİRİLMESİ Aleyna Nur EKER, Jiyan TURAN, <u>Ahmet KAYA</u> , Berivan İLHAN, Muhammetcan ÜSTÜN, Şule ŞAHİN, Muhammet Salih KARATAŞ, Ubeyt BAŞYİĞİT	56
9	SUSUYORUZ (SU İSRAFI FARKINDALIĞI) <u>Menduha ŞAHİN</u> , Nilüfer YEŞİLYURT, Yunus Emre DERE, Efe Erdem ÇEVİK, Zeynep İPEK, Zeynep KILIÇ ¹ , Mustafa TEKİN, Ayşe Nur KALEM, Hatice Kübra ALTUNCAN, Aynur BURHANİ, Gülistan Sanem SARIBAŞ	57
10	BENİM KULÜBÜM YEŞİLAY PROJESİ <u>Hamza Alp Eren Korkut</u> , <u>Mehmet Ali Özdemir</u> , Başak Aycan Mallı, Fatma Büşra Adam, Saliha Yalçın, Adalet Bilge Baykal, Gamze Aslan, Halime Yıldız, Ercan Şimşek, Yunus MACİT	58
11	OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE YAPTIĞIMIZ FARKINDALIK ÇALIŞMASI Ahmet Batuhan KARAPÜR Anıl BAŞAK Ayşenur DURAK Dilara DEMİR Halit ÇOBAN Nida Şevval BÜYÜKTATAR Onur KAYA Sena KARA Tuğçe HALICI Utku YERTÜRK, Ekin ÇELİK	59



12	DUMANSIZ FAKÜLTEMİZ İÇİN ADIM ADIM Sevval ÜNEŞİ Kübra KOÇAŞ—Sevde YURTSEVEN Alişan DUACI—Berfin DEMIRKIRAN-Belkıs BAKMAZ Gülhanım DEVECİ ¹ -Ülken Tunga BABAOĞLU	60
13	TÜM DÜNYA EL ELE, KANSERE GÜLE GÜLE M. Burak KARATAŞ , Tarık BAYKARA, Ümmühan ERDOĞAN, Nazire Nur KURT, Zeynep MUTLU, Davut Eren CANBUDAK, Cemaziye DEĞİRMENCİ, Sara Abed EL-HALİK, Fatma Filiz ARI	61
14	DİJİTAL OBEZ OLMA Ayşe DİRİCAN, Suzan DOĞAN, Afra ÇELİK, Sefa SARI , Ömer Altuğ ÖZKAN, Suzan AVCI, Zeliha ARICI, Yasin PEKUZ, Betül TEZGEL	62



Dayetli Konuşmalar

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA Ahi Evran Üniversitesi Rektörü	"Ahilik Değerinde İnsan"
Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN YÖK Yürütme Kurulu Üyesi	"Toparlanın Tuşluyoruz"
Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ Erciyes Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesi	"COVID-19 Aşı Geliştirme Çalışması"



BİLDİRİ ÖZETLERİ

13

Araştırma Proje Özetleri Sosyal Sorumluluk Proje Özetleri



4. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu
Program & Özet Bildiri Kitapçığı
22 Mayıs 2021



Arařtırma Proje zetleri



COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİ VE ÖNCESİNDE SAĞLIKTA ŞİDDET

Güneş KÜÇÜK¹, Eylül Ece KILIÇLI¹, Selcan TAY¹, Esmâ Berivan SELÇUKOĞLU¹, **Ömürcahan Sadettin AYDIN¹**, Mustafa AĞCA¹, Ayetullah TUNCEL¹, Burak Emre ASLAN¹, Reşit KAVAKLI¹, İbrahim EROĞLU²,

¹Öğrenci, Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

²Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kırşehir

Özet

Amaç: TTB ‘nin 1 Ocak-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında açıkladığı veriler 8 bin 498 sözel, 211 fiziksel, 2 bin 22 fiziksel ve sözel olmak üzere toplam 10 bin 731 sağlık emekçisine yönelik şiddet vakası gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu da göstermektedir ki sağlıkta şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorundur. Bu çalışmada da Covid-19 pandemisi sürecindeki yaşanan gelişmelerin sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete olan etkisi araştırılmıştır.

Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmada, 191 gönüllü sağlık çalışanına 55 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Soru formunda yaş, cinsiyet, medeni hali, mesleği, çalıştığı kurumun yanı sıra Covid-19 sürecinde ve öncesinde maruz kalınan ve karşılaşılan sağlıkta şiddet eylemlerine yönelik sorular bulunmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde “SPSS for Windows 26.0” paket programı kullanıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 33,51±8,19 olarak saptanan katılımcıların %62,3’ü kadın (n=119), %37,69’u erkek (n=72)’tir. Katılımcıların %58,6’sı (n=112) hekim, %27,2’si (n=52) Ebe-Hemşire-ATT, %14,1’i (n=27) ise diğer sağlık çalışanıdır. Katılımcıların % 59.7’si (n=114) meslek hayatı boyunca görevleri sırasında şiddete maruz kaldığı, %28,3’ü (n=54) şahit oldukları, %12’si (n=23) şiddete maruz kalmadığı ve şahit olmadığı, şiddete maruz kaldığını belirten 114 sağlık çalışanının %90.4’ü birden çok defa şiddete maruz kaldıkları, şiddet mağduru olanların %99.1’i sözel, %20.4’ü fiziksel, %2,7’si de cinsel şiddete maruz kaldıkları görülmüştür. Katılımcılar Covid-19 Pandemisi öncesinde ve sürecinde maruz kaldıkları şiddet olayları karşılaştırılmasında pandemi öncesi %55’i şiddete maruz kaldığını belirtirken, pandemi sürecinde %36,1’i şiddete maruz kaldığını izlenmiştir (McNemar Test p<0,001). Yapılan ankette pandemi öncesi ve süreci arasında karşılaşılan şiddet sıklığı azalma olduğu görülmüş, Marginal Homogeneity Test ile yapılan karşılaştırmada anlamlı farklılık saptanmıştır. Pandemi sürecinde hasta yoğunluğunda azalma, randevu sistemine uyumda artma ve hekimlerin hastalarına ayırdıkları sürede artma olduğu görülmüştür.

Sonuç: Genel olarak çalışmamızda sonuçlar şu şekildedir; Covid-19 Pandemisi öncesi ve sürecinde karşılaşılan sağlıkta şiddet olaylarında şiddet maruziyetinin ve karşılaşılan şiddet sıklığının istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmış olduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Covid-19, pandemi, sağlıkta şiddet, sağlık çalışanları.



ACİL SERVİSE BAŞVURAN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARDA HEMOGLOBİN VE ÜRE DÜZEYİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Muhammet Furkan BEKMEZ¹, Abdullah Gürkan ACAR¹, Yunus Ömer ŞAHİN¹, Buse BAYDEMİR¹, Ahmet Kemal UYGUN¹, Mehmet ORHAN¹, Betül KAÇMAZ¹, CANSEL YILDIRIM¹, Sercan EROĞLU²

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Öğrenci¹

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Acil Tıp AD². Kırşehir

Özet

Amaç: Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları, hastaneye yatışların yaygın sebeplerindendir. Çalışmamızda acil servise başvuran gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda hemoglobin ve üre düzeyinin mortalite üzerine etkisi incelenmiştir.

Yöntem: Bu çalışmada 2018-2019 arasında, acil servise başvuran gastrointestinal kanama şikayetiyle başvuran, 18 yaş üstü hastaların verileri incelenerek yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler olarak ortalama±std.sapma, medyan, minimum ve maksimum değerleri verildi, hemoglobin ve üre değerlerinin mortalite grupları arasında farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde Mann-Whitney U testinden yararlanıldı. p<0,05 istatistiksel anlamlılık olarak kabul edildi. Analizlerin tümü SPSS 21.0 paket programı ile yapıldı.

Bulgular: Çalışma için 131 hasta belirlenmiş olup 121 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 67 si (%55,3) erkek, 54 ü (%44,6) kadın olduğu tespit edilmiştir. Hastaların % 57 si 65 yaş üstü olup en küçük yaşı 18, en büyük yaşı 107, yaş ortalaması 64,8 olarak hesaplandı. Analiz sonuçlarına göre, hemoglobin değerleri taburcu ve ex grupları arasında anlamlı farklılık göstermezken (p:0,068), üre değerleri bakımından mortalite grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık elde edildi (p:0,001). Ex grubunda üre değerleri, taburcu grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu.

Sonuç: Özellikle Acil servise başvuran GİS kanaması olan hastaların risk durumunun ortaya konulması için daha pratik belirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Hemoglobin düzeyinin mortaliteyi göstermede yetersiz kaldığı, kan üre düzeyi bu konuda yardımcı parametre olabileceği görülmüştür. Ancak bunlarla ilgili daha fazla ve detaylı klinik çalışma yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Gastrointestinal sistem kanaması, üre, hemoglobin, mortalite



COVID 19 GEÇİREN ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kerem AKIN*, Ziynet YILMAZ*, Hale ALTUNER*, Ecrin ÖZDEMİR*, Buse TÜRKMEN*, Emirkan YILDIZ*, İremnur SÜME*, Yusuf Ziya ÖZGÜLTEKİN*, Ramazan DULKADİR**

*Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir/Türkiye

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hast. AD². Kırşehir

Amaç: Çalışmamızda Covid 19 geçiren çocukların sosyodemografik ve klinik özellikleri ile ailelerin hastalığa yaklaşımını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma; 2019-2021 yılları arasında Covid 19 geçiren çocuklar ve aileleri ile Google online anket aracılığıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak; gerekli literatür taraması sonucunda oluşturulan 25 soru katılımcılara online olarak yöneltilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 193 kişi katıldı. Katılımcıların 103'ü(%53,4) kız, 83'ü(%43) erkekti. Yaş ortalamaları 11,71'di (med=13,min=1,max=18). Hastaların 121'i (%62) on yaş ve üzerinde idi. Covid 19 geçiren çocukların 178'i (%92,2) ayaktan tedavi edildi. 167'si (%86,5) çekirdek aile üyesi, 19'u(%9,8) geniş aile üyesiydi. Covid 19'a yakalandıkları mevsim en çok sonbahardı (%43). Covid 19 a yakalananlar hastalığı en çok aileden (%43,2) sonra da akrabalarından (%16) almışlardır. 28'i(%8,9) nereden kapıldığını bilmemektedir. Hastalığa yakalananların ilk şikayeti en sık %22,9 ile ateş, ikinci sıklıkta ise %20,3 ile halsizlikti. En uzun süren şikayetleri ise (%21,6) halsizlik ile (%16,5) tat ve koku kaybıydı. Hastaların %19'unda semptom görülmedi. Hastaların 81'inde(%42) tedaviye başlandı. Hastaların 8'i (%4,1) hastanede yatarak tedavi edilmiştir. Semptomlar hastaların 70'inde (%36,3) 3 gün, 37'sinde(%19,2) 5 gün sürmüştür. 15.günde hastaların 33'ünde(%14) tat ve koku kaybı devam etti. 30. ve 45. günlerde hastalarda en sık tat ve koku kaybının devam ettiği söylendi. Bu süreçte hastaların 154'ü(%62,9) hastalık kaygısı, 40'ı(%16,3) hastane korkusu, 35'i(%14,3) sağlık hizmetine ulaşmada zorluk, 16'sı (%6,5) ise tedaviye uyumda zorluk yaşadığını söyledi. Hastalık döneminde %65,8'i C vitamini, %50,3'ü D vitamini, %47,2'si bitkisel ürün desteği aldığını belirtti. Cinsiyet ve tedaviye başlama arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05).

Sonuç: Covid 19 önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocuklarda erişkinlere göre daha hafif seyirli olmakla birlikte uzun dönem komplikasyonları hala bilinmemektedir. Bu yüzden hastalıktan korunmak ve aileleri çocuklar konusunda alacağı önlemler açısından bilgilendirmek son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, çocuk, semptom.



TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE DERS ÇALIŞMA SAATLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Enes KOÇ*, **Muhammed Emir SÜMER***, Sefa BADEM*, İsmail BÖREKÇİ*, Melihcan YAĞMUR*, Ceyda Gül Hifa BAYHAN*, Aslıhan TÜYSÜZ*, Sümeyra ASLAN*, Nazlı Nur ALTUN*

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Kırşehir, Türkiye

Özet

Amaç: Yıllardan beri insan vücudunun anatomik yapısı, normal sınırları ve bunlarla ilgili standart ölçülerin ne olması gerektiği tartışılmış ve birbirleriyle olan ilişkileri incelenerek belirli normlar oluşturulmuştur. Çalışmamızda amacımız; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden alınan deri kıvrım kalınlıkları ve kavrama kuvvetlerini değerlendirmek, bu değerleri günlük ders çalışma saatleri ile ilişkilendirmek ve cinsiyetler arası karşılaştırma yapıp fark olup olmadığını tespit etmektir.

Yöntem: Bu doğrultuda çalışmamız Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan, 18-21 yaş arası 50 erkek ve 50 kız olmak üzere toplam 100 öğrenci üzerinde yapıldı. Verilerden; deri kıvrım kalınlığı Skinfold caliper ile; bel ve kalça çevresi mezura ile; kavrama kuvvetleri ise Handgrip strength ve Pinch Strength ile ölçüldü. Öğrencilerin mevcut hareketlilik durumunu tespit etmek için, antropometrik ölçümlere başlanmadan önce IPAQ Short Form (Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi) uygulandı.

Bulgular: Çalışmamıza katılan öğrencilerde, ders çalışma süreleri arttıkça kavrama kuvvetlerinin yani vücudun genel kas kuvveti göstergesinin azaldığı göze çarpmaktadır. Ders çalışma süreleri ile palmar pinch, key pinch ve HGS(kavrama kuvveti) arasında hem kızlar da hem de erkekler de negatif yönlü bir korelasyon tespit edilmiştir. Çalışmamızda cinsiyet ayrımı olmaksızın ders çalışma süresi arttıkça, ölçülen triceps, biceps, suprailak ve suprascapular deri kıvrım kalınlığının arttığı gözlemlenmiştir.

Sonuç: Bu sonuçlar kapsamında; tıp fakültesi öğrencilerinde ders çalışma süreleri arttıkça vücuttaki genel yağ oranının arttığı ve kas kuvvetinin de azaldığı göze çarpmaktadır. Yoğun ders çalışma programına sahip olan tıp fakültesi öğrencilerinin gün içerisinde belli periyotlarda hafif veya orta düzeyde ev egzersizleri yapmaları yukarıda ortaya konulan olumsuz sonuçların önüne geçeceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Skinfold, Antropometri, Deri kıvrım kalınlığı.



GERİATRİK KALÇA KIRIĞI HASTALARINDA CERRAHİ TEDAVİ ALAN VE ALMAYANLARIN 1 YILLIK MORTALİTE ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Beyza ŞAHAN*, Merve GÜNER*, Bilal AKYOL*, Ece KAPLAN*, Halil İbrahim KÖZOĞLU* , Engin YAPICI*, Ahmet Koray KARAISLI*, Havva Nur TÜRKOĞLU, Hakkı Çağdaş BASAT**

*Kırşehir Ahi Evran üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci, Kırşehir

**Kırşehir Ahi Evran üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Kırşehir.

Özet

Kırşehir ilinde kliniğimize gelen ve bilgilerine ulaşabildiğimiz kalça kırığı hastalarıyla yaptığımız dosya araştırmasında hastalarımızın %85 oranında ameliyat olduğu sonucuna ulaştık. Mortalite oranlarına göre ameliyat olup hayatta kalma oranının daha yüksek olduğu kanısına vardık ardından spesifik bir süzgeç uygulayıp erkek hastalarda ameliyat sonrası yaşam oranının daha yüksek olduğunu da bulduk.

In the information research we conduct with patients who come to the hospital in Kırşehir and whose information we know, we cover the rate of 85% of our hip fracture patients suffering from. When we looked at the amount of mortality, we found that the rate of durability was higher after surgery. We also found that male patients had higher postoperative durability rates using a specific sieve.

Anahtar Kelimeler: Kalça Kırığı, Ameliyat, Mortalite



ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA TELEFON TAKİP SİSTEMİNİN EGZERSİZ TEDAVİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ezgi Feyza AYDIN* Furkan Ali UÇAR* **Beyza Nur KARTAL*** Sare YILMAZ* Şevval Beyza ÇELİK* Batuhan ŞAHİN* Umut GÜNTEMUR* Mualla ÖZSÖZ*

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir

Özet

Giriş ve Amaç: Ankilozan spondilit tedavisinde egzersizin önemi büyüktür ancak hastaların egzersize uyumu düşüktür. Bu çalışmada Ankilozan spondilit tanılı hastalarda telefonla takip sisteminin egzersiz tedavisine uyumu ve analjezik kullanımına etkisini incelemek amaçlanmıştır.

Araç ve Yöntem: Modifiye New York kriterlerine [19] göre AS tanılı 60 hasta çalışmaya dahil edildi.

Başlangıçta kriterleri karşılayan 60 hasta Closed Envelope metoduyla iki gruba ayrıldı. 1.gruptaki hastalar her hafta telefon ile arandı. Aranan hastaların ağrı durumları, haftalık aldıkları analjezik tablet sayısı ve egzersiz süreleri sorgulandı. 2.gruptaki hastalar ise telefon ile aranarak sorgulanmadı.

Bulgular: Telefon takip sistemi ile düzenli olarak aranan hasta grubunun egzersiz yapma süresi anlamlı olarak artar iken aranmayan grupta artma izlenmedi. Ayrıca ağrı durumu ve analjezik tablet alımında da anlamlı düşüş saptandı. Ancak aranmayan gruptaki hastaların ağrı durumunda ve analjezik alımında azalma izlenmedi.

Düzenli aranan hasta grubunun aldıkları tedavi veya haftalık aktivite düzeyi, telefon takip sisteminin olumlu etkisini etkilememektedir.

Sonuç: Birçok kılavuza göre egzersiz tedavisi AS hastalarına mutlaka verilmesi gereken bir tedavidir. Bu çalışma telefonla takip sisteminin, Ankilozan Spondilit hastalarında egzersize uyumu arttırdığını dolayısıyla hastalık aktivitesini ve alınan analjezik miktarını azalttığını göstermiştir. Çalışmamızın Ankilozan Spondilit gibi tedavisi olmayan hastalıkların ilerlemesinin engellemesinde faydalı bir yöntem sunduğunu düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: telefonla takip sistemi, ankilozan spondilit, egzersiz tedavisi, AS



OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN TÜRK POPULASYONUNDA GPX1 Pro198Leu ve MnSOD Ala16Val ANTİOKSİDAN ENZİM GEN POLİMORFİZMLERİ VAR MI?

Harun SOYALIÇ¹, **Eren SERİN**², Ceren ÖZDAĞ², Bedriye Rumeysa YUMUŞAK², İdil KOCA², Furkan SARIYILDIZ², Selin SAKALLI², Ayşenur Zehra YILMAZ², Hasan Hüseyin DEMİR², Mert EFE², Mehmet Ali AKGÜN²

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, Kırşehir

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı OUAS ve GPX1 *Pro198Leu*, MnSOD *Ala16Val* gen polimorfizmleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmaya OUAS'lı 81 hasta ve 75 sağlıklı kontrol dahil edildi. MnSOD rs4880 T/C (*Ala16Val*) ve GPX1 rs1050450 T/C (*Pro198Leu*) varyantlarının genotipleri, SNP tipleme analizi ile belirlenmiştir.

Bulgular: MnSOD rs4880T / T, T / C, C / C frekansları hastalarda sırasıyla %35.8, %50.6 ve %13.5 ve kontrollerde %34.6, %49.3 ve %16 idi. Hastalar ve kontroller arasında MnSOD rs4880 varyant genotipi ve alel dağılımı açısından anlamlı fark saptanmadı (OR: 1.07; %95 CI: 0.68-1.69; p> 0.05). GPX1 rs1050450T / T, T / C, C / C frekansları hastalarda sırasıyla %12.0, %38.5 ve %49.4 ve kontrollerde %13.1, %42.1 ve %44.7 idi. Hastalar ve kontrol grubu arasında GPX1 rs1050450 varyantının genotip ve alel frekanslarında anlamlı bir fark gözlenmedi (p> 0.05). Ayrıca OSAS hastalarında ve kontrollerinde iki varyant için kombine genotiplere dayanan haplotipi arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamız, GPX1 *Pro198Leu*, MnSOD *Ala16Val* gen varyantlarının OUAS ile ilişkili olmadığını göstermektedir. İleri çalışmalar, bu iki polimorfizmin OUAS hastalarında bazı klinik parametrelerle ilişkili olduğunu ortaya çıkarabilir.

Anahtar Kelimeler: Gen polimorfizm, GPX1, MnSOD, Obstrüktif uyku apne sendromu, oksidatif stres



COVID-19 GEÇİREN BİREYLERİN HASTALIK SONRASI KORUNMAYA YÖNELİK TEDBİRLERE UYMA DURUMU

Nazlı ÇELİK¹, Melisa GÜLER², Ercan KOZAN², Serife Nur AKYÜREK², Nihal BAYRAKTAR², Berivan HAYKIR², Mustafa ORDU², Kübra YILDIZ², Furkan DOĞAN², Buse ACIGÖZ²

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Kırşehir

²Öğrenci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir

Özet

Amaç: Bu çalışmamızın amacı Covid-19 geçiren kişilerin hastalık sonrası tedbirlere uyma düzeylerini değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışmaya Covid-19 geçirmiş 90 erkek, 144 kadın olmak üzere toplam 234 kişi katılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik özellikler ve hastalık seyirleriyle ilgili 12, hastalık öncesi ve sonrası tedbirlere uyma durumlarıyla ilgili 13 olmak üzere toplam 25 sorudan oluşan anketimiz on-line olarak uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda Covid-19 geçiren kişilerde en sık görülen semptomlar ateş, halsizlik, eklem ağrısı, tat ve koku kaybı olarak saptanmıştır. Kişilerin %5'inin hastalıktan önce maskesiz dışarı çıktığı, hastalığı geçirdikten sonra ise bu oranın %4'e düştüğü görülmüştür. 144 (%61,5) katılımcının hastalığı geçirdikten sonra dışarı çıkarken yanında kolonya/dezenfektan bulundurduğu tespit edilmiş ve bu sayının hastalık öncesine göre anlamlı olarak arttığı görülmüştür (p=0,005). Kişilerin %15'i Covid-19 geçirmeden önce toplu taşıma kullanırken, hastalığı geçirdikten sonra bu oran %12'ye düşmüştür. Katılımcıların tedbirlere uymayan kişileri uyarma durumlarında hastalığı geçirdikten sonra anlamlı düzeyde artış saptanmıştır (p=0,002). Ayrıca katılımcıların Covid-19 geçirdikten sonra sosyal mesafeye dikkat etme sıklıklarının yaklaşık %9 oranında arttığı tespit edilmiştir.

Sonuç: İnsanların Covid-19 geçirdikten sonra tedbirlere uyma konusunda daha hassas davrandığı görülmektedir. Kişilerde bu tedbirlere karşı farkındalığın artması, maske-mesafe ve kişisel hijyene uyum sağlanması hastalığın seyrinin yavaşlaması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hastalık, tedbir



DÜNYA TARİHİNDEKİ BÜYÜK SALGINLAR

Demir E*, Zeytun E*, Yıldız E*, Donat H*, **DEMİR İlayda***, Sarıkaya N*, Ayoub Z*, Sarı Z*

*Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencisi

Özet

Salgın hastalıklar tarih boyunca insanlık için ortak bir sorun olmuştur. Çünkü sadece enfekte bireyleri değil görüldüğü toplumdaki tüm bireyleri pek çok yönden etkilemektedir. Tarih boyunca salgınların pek çok ülkeyi ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan başta olmak üzere pek çok alanda etkilediği görülür. Dünya tarihinde görülen en önemli ve en büyük salgınlardan başlıcaları şunlardır: sıtma, veba, çiçek, kolera, İspanyol gribi, SARS Cov, ebola ve son olarak hali hazırda Dünya'nın mücadele ettiği COVID 19 pandemisi. Dünya tarihinde yaşanmış olan hastalık salgınlarını incelemek, biz insanlara öğrenilmiş dersler ve tecrübeler kazandırmıştır. Salgınların dün olduğu gibi bugün de var olduğu ve yarın da var olmaları akılda tutulmalıdır. Bu doğrultuda insanlar ve ülkeler olarak önlemler alınarak sağlık alt yapısı ve sistemleri bu tür durumlara karşı hazır vaziyette bulunmalıdır. Çoğu salgınlar toplumlarda kalıcı değişikliklere sebep olmuştur. Bu bize salgılardan sonraki dönemin önemli olduğunu ve salgın yönetiminin hayati bir konu olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Pandemi, salgın, COVID 19



BİREYLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KORKU DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek KUZAY AKSOY¹, Beste DAYAN², Hüdanur AKKÖZE², **Osman Mert YILDIZ²**, Zeynep IŞIK², Can Erce ŞAHİNKUŞ², Emine AYGİN², Rukiye BÜYÜKDEVECİ², Mehmet Furkan AKGÜN²

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Kırşehir

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri, Kırşehir

Özet

Amaç: COVID-19 pandemi sürecinde Türkiye’de yaşayan bireylerin korku düzeylerini ölçmek ve demografik özelliklere göre korku düzeyi farklılıklarını incelemek.

Yöntem: Araştırmaya çevrimiçi anket vasıtasıyla 123’ü kadın ve 77’si erkek olmak üzere toplam 200 kişi katılmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’de yaşayan 18 yaş üstü bireylerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, sosyal mecralar vasıtasıyla basit seçkisiz örnekleme yoluyla ulaşılan kişiler oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıları sınıflandırmak ve COVID-19 Korku düzeylerini ölçmek için Demografik Özellikler Bilgi Formu ve Koronavirüs (COVID-19) Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Uygulanan çevrim içi anket sonucunda toplanan veriler, IBM SPSS Statistics (v26) paket programı ile incelenmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğunun test edilmesi amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Test sonucunda verilerin normal dağılmadığı görüldüğünden istatistiksel incelemede non-parametrik testler olan Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. Bütün analizler $\alpha=0,05$ önem düzeyinde yapılmıştır.

Bulgular: Koronavirüs (COVID-19) Korkusu Ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamında katılımcıların ortaya yakın düzeyde Koronavirüs korkusu yaşadıkları ortaya çıkmıştır ($\bar{X}=17,49$). Kadınların korku düzeylerinin ($X=18,4$) erkeklere kıyasla ($X=15,99$) daha yüksek olduğu saptanmıştır ve cinsiyetler arasında istatistiksel anlamlılık vardır ($p<0,05$). Ayrıca hanehalkında 18 yaş altında birey bulunmayan grubun korku düzeylerinin ($\bar{X}=18,54$) bulunan grubun korku düzeyinden (16,58) yüksek olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir. ($p<0,05$).

Sonuç: Hane halkında 18 yaş altında birey bulunan katılımcıların korku düzeylerinin bulunmayan gruptan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda kadınların korku düzeylerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; COVID-19 Korkusu Ölçeği; Korku Düzeyleri; Koronavirüs.



AİLE HEKİMLERİNİN KOAH TANI VE TEDAVİSİNE YAKLAŞIMLARININ ARAŞTIRILMASI: KIRŞEHİR İL ÖLÇEĞİ

Büşra AKPINAR¹, İrem KESER¹, Çiğdem ATLI¹, Elif Esin BAKIN¹, Esranur KAĞITLI¹, Hilal BAYRAKTAR¹, Hüdanur İNCE¹, Muhammed Furkan ÖZ¹, Nazlı BİLEN¹, Berat Boran KURNAZ¹, Mehmet Cihan YAVAŞ²

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir, Türkiye

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Kırşehir, Türkiye

Özet

Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tüm dünyada ve ülkemizde milyonlarca insanı etkilemektedir. KOAH önlenabilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Çalışmamızda Kırşehir ilindeki görev yapan aile hekimlerinin KOAH tanı ve tedavisine olan yaklaşımlarını araştırmaktır.

Yöntem: Kesitsel düzeyde yapılan çalışma, Kırşehir il merkezinde görev yapan aile hekimleri üzerinde yapıldı. Yüz yüze anket soruları ile veriler elde edilmiştir. Verilerin sayı ve yüzde değerleri ile istatistiksel analizleri yapıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 42,89 olan, Kırşehir ilinde bulunan 76 aile hekiminden 58 'i gönüllü olarak katıldı. Sigara dışında en önemli faktörün meslek hastalığı olduğu (%84,5), nefes darlığının (%70,7) KOAH 'ı düşündürdüğünü, aile merkezlerinde spirometre cihazlarının (%55,2) olduğu cevabı alınmıştır.

Sonuçlar: Kırşehir ilinde aile sağlık merkezlerinde yeterli spirometre cihazının olmadığı, aile hekimlerinin KOAH tanı ve tedavisine olan yaklaşımlarının iyileştirilebileceği, aile hekimlerinin KOAH ile alakalı seminer ve eğitimlerin alınması KOAH 'ın erken teşhisine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimi, Akciğer, KOAH, Nefes Darlığı, Spirometre



COVID-19 PANDEMİSİ VE AŞILARA DAİR TUTUMLARIN İNCELENMESİ

Medine Rana KARATEKELİ ^[1], Beyza Gül AMANET ^[1], Metin ŞİRECİ ^[1], Güneş BAYRAM ^[1], Öznur ÖZ ^[1], İlayda Elif KARCIOĞLU ^[1], Ahmet Erdem ESKİN ^[1], Hasan ER ^[1], Seda KANDEMİR ^[2], Mehmet Sait ÇOBAN ^[3]

[1] Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1 öğrencisi, Kırşehir

[2] Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 3 öğrencisi, Kırşehir

[3] Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD, Kırşehir

Özet

Giriş: COVID-19 pandemisi 1 yılı aşkın süredir devam ederken, aşı konusunda büyük bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen aşı tereddütü aşılama programının başarısızlığını etkileyebilecek en önemli sorunlardan biri olarak gözükmemektedir. Dünyada yirmi yıl önce, “aşı kararsızlığı-aşı reddi” kavramları ortaya çıkmış olup giderek artan aşı reddi vakaları, aşılama oranlarında düşürlere neden olmuştur. Bu çalışmada, insanların COVID-19 ile ilgili aşı tereddütünü ve bu tereddütün ne düzeyde olduğunu araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Etik Kurulundan onay alındı. Web tabanlı 27 soruluk anket 12-20 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcılar ankette cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, coğrafi konum belirtmekle birlikte daha önce hastalığı geçirip geçirmediğini veya bir yakını COVID-19 sebebiyle kaybedip kaybetmediğini belirttiler. Ankette ayrıca katılımcıların aşı bilgisi de sorgulandı. Anket verileri SPSS IBM istatistik programında ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 1036 yanıt alındı. Anketin sonuçlarına göre katılımcılar virüsten korunmak için en güçlü yöntemin aşı olmadığını kesinlikle katılmıyorum (%5,7) ve katılmıyorum (%4,8) seçenekleriyle bildirdi. Bununla birlikte sırası geldiğinde aşı yaptırmayacağını bildirenler popülasyonun %13’ü idi. Aşının yan etkilerinden korkuyor olmak katılımcıların kendileri ve çocukları için kararsızlığın ve reddetmenin en büyük nedeni olarak belirlendi. Ankete katılanların %54,2’si aşının yan etkilerinden korktuklarını ilettiler. Katılımcıların büyük bir kısmı (%40,9) aşının zorunlu değil isteğe bağlı olması gerektiğini belirttiler. Katılımcıların %4’ü ağır derecede aşı tereddütü duyarken büyük bir çoğunluk (%63,3) aşı hakkında hafif derecede tereddüt duyduklarını ifade ettiler. Orta derecede aşı tereddütü duyan kişiler ise popülasyonun %32,7’si idi. Yaptığımız analizler sonucunda aşı tereddütü ile cinsiyet, yaş, coğrafi konum, COVID-19 nedeniyle bir yakını kaybetmek arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı ($p=0,057, p=0,229, p=0,431, p=0,510$). Sonuçlara göre daha önce COVID-19 geçiren kişilerin daha fazla aşı tereddütü duydukları tespit edildi ($p=0,021$). Aşı hakkında daha az bilgi sahibi olan katılımcılar fazla düzeyde aşı tereddütü bildirdiler ($p < 0,001$).

Sonuç: Türkiye’de genel olarak aşı tereddütü olmasa da aşı hakkında bilgi sahibi olmamak aşı tereddütünü arttıran en önemli etken olarak görülmektedir. Aşı hakkında toplumun bilgilendirilmesi aşı tereddütü ve reddini daha da azaltabilecektir.

Anahtar kelimeler: COVID-19, aşı reddi, aşı tereddütü



ACİL SERVİSE MÜRACAAT EDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Osman BEKTAŞ¹, **Berfin Elif KARAMAN¹**, Gülgüşa BUCAK¹, Beria Binnaz KUZU¹, Huriye Hümeysra DURAN¹, Şeyma KARAOSMANOĞLU¹, Yeliz BAKIR¹, Çağrı AKCAN¹, Onur BURGUCU¹, Hacı Mehmet ÇALIŞKAN²

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Kırşehir, Türkiye

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Kırşehir, Türkiye

ÖZET:

Amaç: Bu çalışmada aile içi şiddet nedeni ile acil servise müracaat eden kadınların demografik özellikleri, uğradıkları şiddetin tipi, yaralanma türü ve bölgesi, hangi konsültasyonlara ihtiyaç duyulduğu, şiddete uğramış kadınların psikiyatri başvuru zamanları ve aldıkları tanılarının araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Bu çalışmaya aile içi şiddet nedeni ile acil servise müracaat eden 16 yaş üzeri toplam 203 vaka dahil edilmiştir. Olguların verileri retrospektif olarak hastanenin düzenlediği standart aile içi şiddet formlarından; olguların yaşı, eğitim durumu, evlilik durumu, şiddetin tipi ve yaralanma türü, Adli raporundan hastanın maruz kaldığı şiddetin tipi, yaralanma türü ve bölgesi, çekilen grafiler, tedavi gereksinimi, konsültasyon gereksinimi ve sonuç verileri, Hastane otomasyon sisteminden ise olguların psikiyatri polikliniğine başvuru sayıları, başvuru zamanları oradan aldıkları tanılar ve psikiyatri kliniğine yatış durumlarının bilgileri elde edilmiştir. Bazı hastalar ile telefon görüşmesi yapılarak veriler tamamlanmıştır.

Bulgular: Kadına yönelik şiddet nedeni ile acil servise müracaat eden kadınların yaş ortalaması 32.62±11.62 (16-85) yıldır. En fazla başvuru 20-30 yaş grubunda olup en az başvuru ise 70 yaş ve üzeri grubundadır. Hastaların %72.4'ü evli, %7.4'ü bekar, %18.7'si ise boşanmıştır. Acil servise aile içi şiddet olarak getirilen hastaların %93.6'sı fiziksel şiddet, %3.9'u sözel şiddet ve %2.5'i hem cinsel ve hem de fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Şiddete uğrayan kadınların %8,37'si gebelikleri esnasında şiddete maruz kalmıştır ve bunlardan bir tanesi de 1 hafta içinde düşük yapmıştır. Yaralanma tipleri bakımından en fazla yaralanma %90.6 ile künt yaralanma şeklindedir. İki vaka aile içi şiddet nedeni ile hayatını kaybetmiştir. Olguların %14,7'sinin evlilik öncesi psikiyatri polikliniğine başvurduğu %47,78'inin ise evlilik sonrası psikiyatri polikliniğine başvurduğu tesbit edilmiştir. Psikiyatri polikliniğine başvuran kadınların %30'u anksiyete ve uyum bozukluğu tanısı almıştır.

Sonuç: Kadına yönelik şiddet kadınları; sosyal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel birçok olumsuz yönde etkilemesinin yanında hayat kayıplarına da neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddet toplumumuzun kanayan bir yarasıdır ve bu problemi sağlık sektörünün her aşamasında fark ederek çözüm yolları aranmalıdır.

Anahtar kelimeler: Kadın, şiddet, adli rapor, acil servis, anksiyete.



COVID-19 PANDEMİSİNİN BESLENME VE HAREKET ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

Ahmet Salih CEYLAN*, Feyza SERT*, Aslı İnsal*, Elfin Sueda Çoban*, Aslı Karabulut*, Ali Rıza Kazel*, Zeynep Belemir Baltacı*, Makhmud Makhmudov*, Bekir BULUT**

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir/ Türkiye

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD. Kırşehir/ Türkiye

Özet

Amaç: Katılımcılar açısından Koronavirüs salgınının bireylerin beslenme ve hareket alışkanlıkları üzerine etkisine yönelik katılımcıların algılarının ortaya konulması, online anket gerçekleştirilen alan araştırılmasıyla ölçülmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda cevabı aranan sorular şu şekilde sıralanabilir:

Koronavirüs salgını süresince hareketsizlik sağlığını etkiledi mi?

Hareketsizliğinizi telafi etmek için evde düzenli spor yapıyor musunuz?

Koronavirüs salgını süresince stres ve kaygı yeme alışkanlığınızı değiştirdi mi?

Yöntem: Anketimiz Türkiye genelinde 18 yaş üstü 200 kişiye online olarak uygulanmıştır. Sosyo-demografik (6) ve Covid-19 pandemisi süresince beslenme ve hareket alışkanlıkları üzerine (22) sorular sorulmuştur. Verinin istatistiksel analizi IBM SPSS 23.0 istatistik paket programında yapıldı. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri ortalama, standart sapma ve yüzde olarak belirtildi. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare kullanıldı. $p < 0,05$ istatistiksel anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Sosyo-demografik bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması $39,58 \pm 18,62$ yıl; %46,5'i erkek %53,5' i kadın; %14 ilköğretim, %5 ortaokul, %30 lise, %51 üniversite mezunu; %54,5'i evli, %45,5'i bekar; %43,5'inin geliri yok, %7,5'inin 1000-2000 TL, %12'sinin 2000-3000 TL arası, %13'ünün 3000-4000 TL arası ve %24'ünün 5000 TL ve üstü arası gelir düzeyinde olduğu saptanmıştır.

Katılımcıların %28'i kronik rahatsızlığa sahiptir. Kronik rahatsızlığı bulunan 23 kişinin hastalığı covidle birlikte etkilenmiş, 34 kişininki etkilenmemiştir.

Katılımcıların %46,5'i hareketlerinin az, %40,5'i orta, %26'sı ise hareketlerinin fazla olduğunu, sadece %19'unun düzenli spor yaptığı saptanmıştır.

Katılımcıların %60'ının pandemide yeme arzularının arttığı, %68,5'inin gıda için harcamalarının arttığı, %52'sinin stres ve kaygıdan yeme alışkanlıklarının değiştiği ($p < 0,05$), %60,5'inin çay kahve tüketiminin arttığı, %49,5'inin şifalı bitkiler tükettiği, %39'unun bu süreçte dışarıdan yemek söylediği ve covid sürecinde tatlı, hamur işi ve sebzeli yiyecekleri daha çok tükettiği saptanmıştır.

Yeme arzusunun arttığını söyleyenlerin %48'i gıda ürünleri için harcamayı arttırmıştır ($p < 0,05$). Koronavirüs salgınıyla birlikte; kilo artışının en çok eğitim düzeyi üniversite olan katılımcılarda görüldüğü ($p < 0,05$), gıda tüketimindeki artışın gelir düzeyinden etkilenmediği ($p < 0,05$), alkol ve sigara tüketmeyi bırakma miktarının çok az olduğu, kiloda meydana gelen değişimlerden kadın ve erkeklerin aynı şekilde etkilendiği ($p < 0,05$) saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, COVID-19, Hareket alışkanlıkları



TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CORONAVİRUS HAKKINDAKİ FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Zehranur Dağdelen*, Hüma Münteha Erdoğan*, Yiğit Alp Yaşın*, Esra Öz*, Keziban Tuğba Toprak*, İlayda Sancak*, Gülay Dursun*, Esra Şanlı*, Kağan Tur**

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İç Hastalıkları AD. Kırşehir

Özet

Aralık 2019 da Çin'in Wuhan kentinde başlayan Coronavirus (COVID-19) pandemisi bütün dünyayı etkilemekte ve ciddi mortalite ve morbiditeye neden olmaya devam etmektedir. COVID 19'un direkt kontakt ve respiratuar droplet yolu ile insandan insana bulaşı mümkündür. İnkübasyon periyodu 2-14 gün arasındadır. Semptomları arasında ateş, nefes darlığı, miyalji, yorgunluk, öksürük, koku almada azalma olabilmektedir. Bulaşı önlemek için el hijyeni, yakın temastan kaçınma, temas önlemleri önemli yer tutmaktadır. Tüm dünyada aşılama devam etmektedir. Sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri COVID 19 pandemisinde bulaş riskine en yüksek oranda maruz kalan gruplar arasındadır. Tıp Fakültesi öğrencilerinin COVID 19 bulaş riskine karşı korunma yöntemlerine uymaları, COVID 19 bulaş yolları, korunma yöntemleri, hastalık semptomları ve koronavirus hakkında bilgi sahibi olmaları önem taşımaktadır. Hastane ortamında tıp öğrencilerinin kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve korunma yöntemleri hakkındaki bilgi düzeyi ve farkındalığı önem taşımaktadır. Bu çalışmada Tıp Fakültesi öğrencilerinin COVID 19 hastalığı hakkındaki farkındalıkları, hastalık semptomları, bulaş yolları, inkubasyon süresi, hastalığın ortaya çıkış geçmişi, koronavirus karantina süresi hakkındaki bilgileri, COVID 19 tanı yöntemleri ve koronavirusun özellikleri, COVID 19 için yüksek risk altındaki gruplar hakkındaki bilgileri, hastalık için kötü prognoz faktörleri hakkındaki bilgileri, enfeksiyondan korunma pratikleri ve koruyucu önlemler, temas önlemleri, güvenli temas mesafesi ve kişisel koruyucu önlemler ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeylerinin online anket yöntemi ile araştırılması amaçlanmaktadır. 191 tıp fakültesi öğrencisi online anket ile çalışmaya katılmıştır. Çalışmaya katılanların %93,2'si hastalık bulaş yolları ile ilgili doğru cevap vermiştir. Bulaş riskinden korunma ve gerekli koruyucu mesafe ile ilgili doğru cevap verenlerin oranı %91,6 olarak bulunmuştur. Olası/kesin Covid-19 vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli, kişisel koruyucu malzemeler konusunda öğrencilerin %85,3'ü doğru cevap vermiştir. Koruyucu maske konusunda %86,4 doğru cevap verilmiştir. Koruyucu önlem ve ekipman konusundaki sorularda tıp öğrencileri arasında farkındalık düzeyinin artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Koronavirus, Kişisel Koruyucu Ekipman, Tıp Fakültesi Öğrencileri, COVID-19



COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ ANALİZİ

Ali Rıza PAYAM¹, Barış YAKUT¹, Fatih YILDIRIM¹, **Gözde ATEŞ¹**, Müzeyyen Gizem PARMAK¹, Sena Melis ERKAL¹, Seyit PINARBAŞI¹, Betül SULUBULUT², Süleyman GÜLDAĞI², İrem MERTOĞLU², Batuhan BOZKURT², Mustafa KARA³, Barış ÇIPLAK³

1-Dönem 3 Öğrencisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir

2-Dönem 4 Öğrencisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir

³Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Kırşehir

Amaç: Covid-19 salgını dünya çapında korku ve panik havası oluşturan pandemi döneminde karantina ve sosyal izolasyon tedbirleri alınmıştır. Karantina süresince toplumun genelinde enfeksiyon korkusu, hayal kırıklığı, stress, yetersiz malzeme, yetersiz bilgi, yetersiz sağlık hizmeti ve finansal kayıp endişesi sonucunda ruh sağlığı olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu çalışmada üniversitede okuyan öğrencilerin kaygı düzeyini belirlemek ve koronavirüs salgınından psikolojik olarak etkilenme derecesi hakkında bilgi edinmeyi amaçladık.

Yöntem: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden herhangi bir üniversitede okuyan öğrencilere ve üniversite öğrencisi olmayan kontrol grubuna Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (CAS; Coronavirus Anxiety Scale) anketi yapıldı. İnternet ortamında hazırlanan anket aracılığı ile sosyal medya, e-posta ve whatsapp grupları arasında çevrimiçi bir anket bağlantısı üzerinden öğrencilere link gönderilerek veya yüzyüze görüşme şeklinde gerçekleştirildi. Analizler sonucunda verinin dağılım özelliğine göre ortalama±SD ya da %(n) değerleri alınarak, istatistiksel analizler için SPSS Version 22.0 paket programı kullanıldı. $p < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Sonuçlar: Katılımcıların %56,5(n,161)'i üniversite öğrencisi ve %43,5(n,209) üniversite öğrencisi olmayan kontrol grubu olmak üzere toplam 370 gönüllüye anket dolduruldu. Katılımcıların yaşları çoğunlukla 18-24 aralığında, %58,9(n,218)'u kız öğrenci, %41,1(n,152)'i erkek öğrenciydi. Öğrencilerden %4,1(n,15)'i evli, %95,9(n,355)'u bekardı. Kullanılan anket en düşük puanı 0, en yüksek puanı 20 puan aralığındaydı. Tüm katılımcıların anket puanı ortalaması 1,7 (±2,6) olarak tespit edildi. Üniversite öğrencisi olma durumu, cinsiyet ve medeni durumları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı($p > 0,05$). Bu karşılaştırmalar Tablo 1'de özetlenmiştir. Bu araştırmadan çıkan sonuç; pandemi döneminde üniversite öğrencilerinde kaygı düzeyinde anlamlı bir artış olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği, Kaygı Düzeyi

Tablo 1. İstatistik Değerlendirme

	n	Anket Puanı Mean(±SD)	p
Üniversite öğrencisi	Evet(n,161)	1,75(±2,54)	$p > 0,05$
	Hayır(n,209)	1,67(±2,79)	
Cinsiyet	Kız(n,218)	1,89(±2,83)	$p > 0,05$
	Erkek(n,152)	1,44(±2,45)	
Medeni Durum	Evli(n,15)	1,46(±2,13)	$p > 0,05$
	Bekar(n,355)	1,71(±2,71)	

Veri analizlerinde Independent Samples Test (T-Test) kullanıldı



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HPV VE HPV AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ

Sümeyye KIŞLALI¹, Deniz ERİM¹, Muhammed SUNGUR¹, Ömer Faruk YURDAKUL¹, Mücahit Cafer DOKUMACI¹, Zeynep Rumeysa CANDEMİR¹, **Senol ÇAKIR¹**, Mustafa TEKİN¹ Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU² Barış ÇIPLAK³

1-Dönem 1 Öğrencisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir

2-Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Kırşehir

3- Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Kırşehir

Özet

Amaç: Human papilloma virüs (HPV) enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıkların başında gelmektedir. Cinsel olarak aktif kadınlar HPV enfeksiyonunun neden olduğu genital verru ve serviks kanser için risk altındadırlar. Bu çalışmada toplumumuzun genç yaş grubu olan üniversite öğrencilerinde HPV ve HPV aşısı bilgi düzeyini belirlemektir. Cinsel yaşamın başındaki bu grupta serviks kanseri gibi ciddi sonuçları olan HPV enfeksiyonu hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladık.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte planlanan bu araştırma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden üniversite öğrencilerine HPV ve HPV Aşısı Bilgi Düzeyi Anketi kullanılarak yapılacaktır. Anket formu HPV ve HPV aşısı bilgi düzeyiyle ilgili literatürdeki benzer çalışmalar gözden geçirilerek hazırlanmış 16 sorudan oluşmaktadır. Veri toplanması; internet ortamında hazırlanan anket aracılığı ile sosyal medya, e-posta ve whatsapp grupları arasında çevrimiçi bir anket bağlantısı üzerinden öğrencilere link gönderilerek gerçekleştirilecektir. Elde edilen veriler “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS Inc, Chicago, USA) 22.0 paket programı ile değerlendirilecektir. Tanımlayıcı, frekans, merkezi dağılım ve yaygınlık ölçütleri ve karşılaştırmalar için ki kare, korelasyon analizleri yapılacaktır. Bu analizlerde $p < 0,05$ düzeyi anlamlı kabul edilecektir.

Sonuçlar: Çalışmamıza 165(%76) kız ve 50(%23) erkek öğrenci olmak üzere toplam 215(%100) gönüllü üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20,6($\pm 4,4$), 15(%6,9)’i evli ve 200(%92,2)’si bekarıdır. Yine katılımcıların 187(%86,2)’nin cinsel ilişki deneyimi yoktu, cinsel deneyimi olan 28(%13,8) gönüllünün 23’ün ilk cinsel deneyim yaşı 18-24 yaş arasındaydı. Katılımcılardan 142(%66)’si HPV bilgi düzeylerini “Hiç bilgim yok ve Çok az bilgim var” olarak cevapladı. Yine katılımcılardan 161(%74,8)’i HPV aşısı bilgi düzeyini “Hiç bilgim yok ve Çok az bilgim var” olarak cevapladı. Tüm katılımcıların sorulara verdikleri cevapları **tablo 1**’de analiz ettik. Cevaplardan bilmiyorum cevabı çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ayrıca kız ve erkekler arası bilgi düzeyi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ($p > 0,05$). Yaptığımız bu çalışmada bize üniversitemiz öğrencilerinin HPV ve HPV aşısı bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı görülmektedir. Toplumumuzun cinsel sağlığı için bu konuda daha fazla eğitime ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: HPV, HPV Aşısı, HPV Bilgi Düzeyi

Tablo 1.Anket Sorularına verilen cevaplar

Anket Sorusu	Anket Cevapları n(%)		
HPV bilgi düzeyi için sorulan sorular	*Evet	Hayır	Bilmiyorum
HPV, rahim ağzı kanserine neden olabilir.	89(%41,4)	4(%1,9)	122(%56,7)
HPV cinsel ilişki sırasında bulaşabilir.	154(%71,6)	1(%0,5)	60(%27,9)
HPV cinsel bölgedeki cilde, temas ile bulaşabilir.	102(%47,4)	14(%6,5)	99(%46,0)
Erken yaşta cinsel ilişki, HPV bulaşma riskini artırır.	46(%21,4)	30(%14,0)	139(%64,7)
Birden fazla cinsel eş, HPV bulaşma riskini artırır.	152(%70,7)	1(%0,5)	62(%28,8)
Prezervatif kullanmak HPV bulaşma riskini azaltır.	105(%48,8)	9(%4,2)	101(%47,0)
HPV cinsel bölgede sigillere neden olabilir.	0(%0)	89(%41,4)	126(%58,6)
HPV’nin birçok tipi vardır.	77(%35,8)	3(%1,4)	135(%62,8)
HPV Aşısı bilgi düzeyi için sorulan sorular			
HPV aşısı, rahim ağzı kanserinden korur.	66(%30,7)	3(%1,4)	146(%67,9)
HPV aşısı, cinsel bölgede sigile karşı korur.	71(%33,0)	2(%0,9)	142(%66,0)
HPV aşısının üç doz yapılması gerekir.	18(%8,4)	3(%1,4)	194(%90,2)
HPV aşısı 11-26 yaşlar arasındaki tüm kadınlara önerilir.	36(%16,7)	7(%3,3)	172(%80,0)
HPV aşısı 11-26 yaşlar arasındaki erkeklere yapılabilir.	25(%11,6)	9(%4,2)	181(%84,2)

*Evet doğru cevap



KAEÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Esma GÜZELOĞLU*, **Deniz ŞENTÜRK***, Nezaket DEMİRDELEN*, Derya ÜNLÜTÜRK*, Yeşim ÖZ*,
Emine Betül TUFAN*, Esmâ Hüsnâ TORUN*, Ahmet Selim DUYGU*, Naime Meriç KONAR**

*: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir, Türkiye

** : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, Kırşehir, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda KAEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin COVID-19 pandemisi hakkında bilgi düzeyleri, tutumları ve risk algılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Öğrencilere salgın hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek için 7, görüş-tutumlarının belirlenmesi için 5, risk algılarının değerlendirilmesi için 6, toplamda 18 soruluk online anket uygulanmıştır. Yanıtlar Ki-Kare testi ile analiz edilmiştir, analizler için SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplam 175 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların COVID-19 hakkındaki bilgi düzeyleri, risk algıları ile görüş ve tutumları ve cinsiyet grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır($p>0,05$). Pre-klinik ve klinik dönemler arasında risk algısı, görüş-tutum ve bilgi düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır($p>0,05$). Kronik hastalığı olan ve olmayanlar arasında bilgi düzeyi ve risk algısı açısından anlamlı farklılık elde edilmemiştir($p>0,05$). Fakat kronik hastalık varlığı ile görüş – tutum arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır($p<0,05$). Bu sonuca göre, kronik hastalığı olanlarda COVID-19 salgını ile ilgili negatif görüş ve tutum oranı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, tıp fakültesi öğrencilerinde bilgi düzeyi ve risk algısı oranları yüksek bulunmuştur. Bunun yanı sıra, kronik hastalığı olan öğrencilerin salgınla ilgili daha olumsuz görüş-tutuma sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuçlar: Özellikle kronik hastalığa sahip öğrencilere salgınla ilgili daha çok bilgilendirmenin yapılması önerilir. Genel olarak, COVID-19’a karşı koruyucu önlemler hakkında bilgilendirmelerin artırılması, çalışmada saptanan yüksek risk algısının düşürülmesi açısından yararlı olabilir, bu nedenle tüm tıp fakültesi öğrencileri için gerekli bilgilendirmelerin artırılması önerilir.

Anahtar Kelimeler : COVID-19, bilgi düzeyi, tutum, risk algısı, SARS-CoV-2



TIP FAKÜLTESİNDE OKUYAN VE OKUMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mustafa ÇELİK*, Oğuz Furkan TETİK**, Burak BUZ**, Mehmet ÖZKAN**, Üzlifet KURNAZ**, Oğulcan SORHAN**, Hamit YILMAZ**, Ravza GÖLEÇ**, Aybüke Gizem ÇAKIN***, Nuray ALBAR ***, Berkan TÜLEK ***

*: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir, Türkiye

** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir, Türkiye

*** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir, Türkiye

Kısa başlık: Üniversite öğrencilerinde sağlık davranışları ve umutsuzluk

Özet

Amaç: Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıklarıyla ilişkili faktörlerin incelenmesi, uzun vadede bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi için sağlık davranışlarını teşvik etmek açısından önemlidir. Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinde umutsuzluğun sağlıklı yaşam biçimi davranışlarıyla ilişkisini incelemektir. Ayrıca tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları diğer bölümlerdeki öğrencilerle karşılaştırılmıştır.

Yöntem: Kesitsel çalışmaya Tıp ve Fen-Edebiyat fakültelerinde okuyan toplam 435 öğrenci katılmıştır. Veriler Demografik Bilgi Formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBD) ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) aracılığıyla toplanmış ve SPSS 22 istatistiksel analiz programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular: BUÖ'den elde edilen puanlar ile SYBD toplam puanı ($r=-0.39$) ve sağlık sorumluluğu ($r=-0.22$), fiziksel aktivite ($r=-0.18$), beslenme ($r=-0.17$), manevi gelişim ($r=-0.53$), kişilerarası ilişkiler ($r=-0.30$) ve stres yönetimi ($r=-0.25$) puanları arasında anlamlı negatif korelasyon bulunmuştur (tamamında $P<0.001$). Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine kıyasla Tıp Fakültesi öğrencileri anlamlı düzeyde daha yüksek fiziksel aktivite (95% CI [0.64, 2.50], $t(406.03)=3.33$, $P<0.001$) ve daha düşük kişilerarası ilişkiler (95% CI [-1.73, -0.10], $t(429.74)=-2.22$, $P=0.027$) alt ölçek puanlarına sahip bulunmuştur.

Sonuç: Tıp fakültesinde okuyan ve okumayan öğrenciler arasında umutsuzluk ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışma, potansiyel davranışların olası sonuçlarına ilişkin olumsuz beklentilerin uzun vadede sağlığı iyileştirebilecek etkinliklerin sürdürülmesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Kişiler arası ilişkilerde bildirilen zayıflık göz önünde bulundurulduğunda tıp eğitimi, öğrencilerin sosyal destek ağlarını geliştirmeleri için gerekli desteği sağlayarak sağlıklarını ve esenliklerini iyileştirmeye yardımcı olmalıdır.

Anahtar kelimeler: sağlıklı yaşam biçimi davranışları, umutsuzluk, üniversite öğrencileri



COVID 19 DÖNEMİNDE PANDEMİ ACİL POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERİN LABORATUVAR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hüseyin Mert YÜKSEL¹, Beyza BAYRAKDAR¹, Burak Ali ÖZDEMİR¹, Ayşe KAMACI¹, Sibel UÇUCU¹, Hakan Koray SÖĞÜT¹, Ali Barış ÜSTÜNDAĞ¹, Merve BAĞ¹, Barış ÇIPLAK², Eyüp Gökhan TURMUŞ²

1- Dönem 1 Öğrencisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir

2- Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Kırşehir

Özet

Amaç: COVID-19 bir halk sağlığı krizi olarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. COVID-19 enfeksiyonunun gebelerde bulaş yolu, semptomları, prognozu, bebeğe geçişi ve tedavisine ilişkin bilgiler hala sınırlıdır. Bu çalışmamızdaki amacımız COVID-19 salgını döneminde Pandemi Acil Polikliniğine başvuran gebelerin laboratuvar sonuçlarını incelemek, yorumlamak ve literatüre katkı sunmaktır.

Yöntem: Çalışmamız için Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan izin alındı. 01 Mart 2020-01 Mart 2021 tarihleri arasında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Pandemi Acil Polk kayıtları retrospektif olarak tarandı. Kayıt sisteminde gebe tanısı girilmiş hastalar seçildi. Bilgisayar sisteminden hastaların Covid PCR, Kan Grubu, CRP, Beyaz Küre, Hemoglobin, Hemotokrit, Platelet, Nötrofil, Lenfosit, Monosit, ALT, AST, Ferritin ve Fibrinojen sonuçları çıkartılıp veri sistemine girildi. Analizler sonucunda verinin dağılım özelliğine göre ortalama±SD veya %(n) şeklinde ifade edildi. İstatistiksel analizler için SPSS Version 22.0 paket programı kullanıldı.

Sonuçlar: Son 1 yıl içerisinde pandemi polikliniğine başvuran ve gebelik tanısı girilmiş 736 gebe saptandı. Bu gebelerden 591 gebeye Covid PCR testi yapılmıştı. Covid testi yapılan hastalardan 341 tane gebenin yukardaki tahlillerinin hepsi yapılmış olduğunu tesbit ettik. Örneklem olarak bu 341 gebenin sonuçlarını inceledik. Hastaların yaş ortalaması 27,7(±5,7) olarak tesbit edildi. Hastaların %35,8(n,122)'nin Covid19 PCR testi pozitif, %64,2(n,219)'nün Covid19 PCR testi negatif olarak tesbit edildi. Covid19 PCR testi pozitif ve Covid19 PCR testi negatif laboratuvar bulguları Tablo-1 de karşılaştırıldığında gruplar arası CRP, Platelet, Monosit ve Fibrinojen seviyeleri arasında anlamlı fark bulundu($P<0,05$). Fakat Covid pozitif grupta yükselmesini beklediğimiz CRP değeri negatif grupta yüksek bulunması dışındaki diğer farklılıklar literatürle uyumluydu. Gebe kadınların klinik ve labotatuvar sonuçlarıyla ilgili literatür incelendiğinde gebe olmayanlarla benzer sonuçlar bulunmuştur. COVID-19 enfeksiyonu kapmaları durumunda orta ila şiddetli hastalık geçirme riski yüksek değildir. Gebe kadınların büyük çoğunluğunun soğuk algınlığı veya grip gibi hafif veya orta şiddette belirtiler yaşamayı veya bazen hiç belirti göstermemesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, COVID 19 Laboratuvar Özellikleri, Gebelikte COVID 19

Tablo 1.Laboratuvar sonuçlarının analizi

	COVIDPCR				COVIDPCR		
	Negatif	Pozitif			Negatif	Pozitif	
	Mean±SD	Mean±SD	p		Mean±SD	Mean±SD	p
CRP	16,4(±29,3)	9,14(±10,1)	*P<0,05	LYM	24,9(±9,8)	25,7(±11,4)	$P>0,05$
WBC	10,6(±5,9)	8,57(±7,4)	$P>0,05$	MONO	7,5(±2,6)	9,3(±3,9)	*P<0,05
HGB	12,5(±2,0)	12,7(±1,4)	$P>0,05$	AST	22,7(±24,0)	25,0(±10,4)	$P>0,05$
HCT	37,8(±4,9)	37,4(±5,3)	$P>0,05$	ALT	18,7(±20,6)	22,5(±16,0)	$P>0,05$
PLT	277(±77,1)	234(±59,0)	*P<0,05	FERRITIN	27,2(±32,3)	27,8(±26,2)	$P>0,05$
NEU	65,6(±11,0)	63,3(±12,7)	$P>0,05$	FİBRNJ	326,4(±93,3)	366,3(±99,5)	*P<0,05

Veri analizlerinde Independent Samples Test (T-Test) kullanıldı.



COVID-19 GEÇİREN KİŞİLERDE EREKTİL DİSFONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNÇALIŞMA

Erol Erşekerci *, Beyza Nur Avara *, Esra Yetimova *, Alperen Güneş*, Beyza Nur Aydın *, Sıla Yaren Erdoğan *, Yunus Emre Bağçacı *, Hakan Bilçen * M.Şahin Bağbancı *, İbrahim Üntan *

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir

Özet:

Amaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19) geçiren kişilerin erkek cinsel yaşamı veya cinsel işlevi üzerindeki etkisine ilişkin çok az yayın bulunmaktadır. Covid-19 geçiren kişilerde erektil fonksiyonun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuru yapıp Covid-19 tanısı alıp tedavi olan kişilere telefon anketi ile İİEF-5 ve YAB-7 test soruları sorularak erektil disfonksiyonları, anksiyete ve kaygı durumları değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 73 kişiye anket yapıldı. Bu kişilerin Covid-19 öncesi İİEF-5 skorları ve YAB-7 skorları Covid-19 geçirdikten sonra 1. ay, 3. ay ve 6. ay değerlendirildi. Covid-19 enfeksiyonu sonrasında 1. ay ile Covid-19 öncesi İİEF-5 skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı ($p<0.001$). Yine Covid-19 enfeksiyonu sonrasında 1. aydaki İİEF-5 skorlarının 6. ay skorları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı ($p<0.05$). Covid-19 enfeksiyonu sonrasında 1. aydaki İİEF-5 skorları istatistiksel olarak anlamlı azalırken, Covid-19 enfeksiyonu sonrasında 6. aydaki İİEF-5 skorları 1. aya göre istatistiksel olarak anlamlı artmıştır. Covid-19 enfeksiyonu öncesi ile Covid-19 sonrası 1. ay, 3. ay ve 6. aydaki YAB-7 test sonuçları karşılaştırıldığı zaman Covid-19 enfeksiyonu öncesi ile Covid-19 sonrasındaki 1. ay ve 3. ay sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir ($p<0.001$ ve $p<0.05$).

Sonuç: Covid-19 enfeksiyonu hem direkt endotel üzerine etkisi hem de anksiyete ve kaygı üzerine etkisinden dolayı erektil disfonksiyona sebep olabilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Eretil Disfonksiyon, Anksiyete, Pandemi



ŞİZOFRENİDE İNTİHAR İÇİN RİSK OLUŞTURAN KAN PARAMETRELERİ

Bilal İLANBEY* **Emine DEMİR**¹, Merve Nurten LÜLE¹, Emre AKAR¹, Beyza AKALIN¹, Nilay AÇACAK¹, Meriç KAVUTÇU¹, Ahmet GÜNAYDIN², Ramazan YILDIRIM², Büşra EKİCİ²

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Kırşehir

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencisi, Kırşehir

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV Öğrencisi, Kırşehir

Amaç: Şizofreni hastalarında intihara kalkışma toplumdaki sağlıklı bireylere göre daha sık görülmektedir. Bizim bu çalışmadaki amacımız intihara kalkışmış şizofren hastaların kalkışmayanlara göre rutinde sık bakılan çeşitli kan parametreleri arasında fark olup olmadığını belirlemektir.

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya Kırşehir Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde şizofreni tanısıyla takip edilen ve intihara kalkışmış 49 hasta ile intihara kalkışmamış 41 hasta dahil edildi. Hasta dosyalarında, hastaların genel demografik karakteristikleri ile birlikte biyokimya, hormon ve kan sayımı parametreleri bakıldı

Bulgular: Her iki grup arasında biyokimya, hormon ve kan sayımı parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Çalışmamızda rutinde sık bakılan biyokimya, hormon ve kan sayımı parametrelerinin şizofreni hastalarında intihar riskini belirlemede faydalı olmadığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, intihara meyil, biyokimyasal parametreler



AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA DUYGUDURUMUN VE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sedanur GEDİKBAŞ¹, Ramazan AYAN¹, Elif IŞIK¹, Esra Nur KARATAY¹, Raziye AKIN¹, Yusuf ÇİFTÇİ¹, Asuman ÇELİKBİLEK²

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Kırşehir

Özet

Amaç: İskemik inme geçiren hastalarda fonksiyonel etkilenmenin yanı sıra psikolojik etkilenmenin de olduğu gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı akut iskemik inmeli hastaların depresyon, anksiyete ve uyku kalitelerini değerlendirmektir.

Yöntem: Bu çalışmaya, Ocak-Nisan 2021 tarihleri arasında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji kliniğinde yatan akut iskemik inme tanılı 58 hasta alındı. Bilinen psikiyatrik hastalık ve/veya uyku bozukluğu olan, bu sebeple ilaç kullanan ve inmenin ağırlığına bağlı olarak kooperasyon kurulamayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik verileri ve laboratuvar değerleri kayıt edildi. Klinik ve görüntüleme özelliklerine göre hastalar büyük damar ateroskleroza (aterotrombotik), kardiyoembolik, küçük damar oklüzyonu (lakün) ve diğer nedenlere bağlı iskemik inme olarak alt tiplere ayrıldı. Hastalara Beck depresyon ölçeği (BDÖ), Beck anksiyete ölçeği (BAÖ) ve Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) uygulandı. BDÖ skorlaması 10 puan ve üzerinde depresyon varlığını, BAÖ skorlaması 8 puan ve üzerinde anksiyete varlığını, PUKİ skorunun 5'in üzerinde olması ise kötü uyku kalitesini gösterdiği kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 28'i (%48.3) kadın, 30'u (%51.7) erkek, ve yaş ortalaması 70.4±9.8 yıl idi. 14 hastada (%24.1) aterotrombotik, 18 hastada (%31.0) kardiyoembolik, 25 hastada (%43.1) laküner inme, 1 hastada (%1.7) diğer nedenlere bağlı inme alt tipi saptandı. Hastaların ortalama BDÖ skoru 11.2±6.1, BAÖ skoru 7.4±6.3 ve PUKİ skoru 6.8±3.3 idi. Hastaların depresyon, anksiyete ve uyku skorları inme alt tipleri arasında anlamlı farklılık göstermedi ($p>0.05$). Doğrusal regresyon analiz sonuçlarına göre yaş, cinsiyet, komorbid hastalıklar, eğitim düzeyi, medeni durum ve yaşam alanı BDÖ, BAÖ ve PUKİ skorlarını anlamlı olarak etkilemedi ($p>0.05$). D vitamin düzeyi BDÖ skoru ile negatif, BAÖ skoru ile pozitif korele bulunurken ($p<0.05$), PUKİ skoru ile anlamlı bir korelasyon göstermedi ($p>0.05$).

Sonuç: Akut iskemik inmeli hastalarda ortalama depresyon skorları yüksek ve uyku kalitesi kötü olarak bulundu. Düşük D vitamini düzeyi depresyonla ilişkili bir faktör olabilir. Bu sonuçların daha büyük hasta grubunda teyit edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Akut iskemik inme, depresyon, anksiyete, uyku



HİPOKAMPAL-ASTROGLİAL HÜCRELERDE 4-AMİNOPİRİDİN KAYNAKLI İN VİTRO EPİLEPSİ MODELİNDE GLUTAMAT EKSTOTOKSİSİTESİ VE TRPC1 KATYON KANALLARI ÜZERİNE HİPERİSİN VE KURKUMİNİN ETKİLERİNİN MOLEKÜLER TEKNİKLERLE İNCELENMESİ

Bilal ÇİĞ*, Ekin ÇELİK*, G. Sanem SARIBAŞ*, Dilek KUZAY*, S. Ata AYDIN*, E. Batuhan AKÇALI*, Hilal EROĞLU*, B. Hasan KAYA*, Ş. Berkay AZGİNOĞLU*, Emir GÖKTÜRK*, Ümran AYDEMİR*, Nihan YILMAZ*, Caner GÜNAYDIN**

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir

**Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun

Epilepsi, WHO verilerine göre dünyada yaklaşık 50 milyon insanda görülen birçok risk faktörüne nörolojik bir hastalıktır. Nöbet önleyici ilaçlar, bireylerin üçte ikisine kadar nöbetleri engellerken uzun vadeli prognozu değiştirmemiştir. Epilepsi cerrahisi ise ilaca dirençli fokal epilepsili kişilerde uzun vadeli nöbet özgürlüğü sağlamanın en etkili yoludur. Epilepsi kaynaklı glutamat eksitotoksitenin, oksidatif stres ve mitokondriyal disfonksiyon ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Beyin, antioksidan enzim aktivitesinin düşük olması nedeniyle oksidatif strese karşı çok hassastır. Bu bakımdan güçlü bir antioksidan olan sarı kantaronun etken maddesi hiperisin ve zerdeçal ekten maddesi kurkuminin epileptik eksitotoksiste üzerine etkisini araştırmak üzere bu çalışmayı planladık. Glutamat eksitotoksitesi postsinaptik bölgede aşırı kalsiyum birikimine neden olur. Kalsiyum iyonlarının geçişi postsinaptik membrandaki metabotropik glutamat reseptörleri ve geçici reseptör potansiyeli katyonik kanalları (TRP) aracılığıyla gerçekleşir. Bu TRP ailesinden TRPC1 kanalları ise epilepsinin meydana geldiği hipokampal nöronlarda ve astrositlerde yoğun ekspresyona sahip olmasına rağmen epilepsideki rolleri belirsizdir. Astrositler, depoladıkları glikojeni nöronların ihtiyacı halinde glikoza çeviren, kalsiyuma bağlı şekilde ATP sentezi ve glutamat salgılanmasında rol alan glial hücrelerdir. Merkezi sinir sistemindeki iyon dengesinde önemli rolleri bulduğundan sinir sistemi hasarında da görev alırlar. TRPC1 kanalları hücresel işlevleri düzenler, bu kanalların disregülasyonları hücre hasarına neden olur. Yapılan çalışmalarda, nörodejeneratif hastalıklar dahil birçok nöronal kaynaklı hastalıklarda TRPC1 kanallarının katkıları belirtilmiştir. Fakat epilepside TRPC1 kanalı üzerinde hiperisinin etkisi belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışma epilepsi kaynaklı eksitotoksistide terapötik yaklaşımlar için önemlidir. Çalışmamızda HT-22 hipokampal ve C8-D1A astroglial hücrelerde oluşturduğumuz gruplar: kontrol, kurkumin (5 µM / 24sa.), 4-AP (100 µM / 60dk) , 4-AP+kurkumin, glutamik asit ve glutamik asit+ kurkumin. Gruplarda bax, bcl2, TRPC1 mRNA düzeyleri RT-PCR ile belirlenirken flow-sitometri tekniğiyle Anneksin V ve PI apoptoz düzeyleri gruplar arası karşılaştırıldı. Ayrıca VGF ve hemotoksilen eozin boyamaları da yapıldı. Sonuç olarak kurkumin ve hiperisin epilepsi kaynaklı oksidatif hasarı önledi. Epilepsi tedavisinde TRPC1 kanalları önemli avantajlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Glutamat eksitotoksitesi, TRPC1, Hiperisin, Kurkumin



COVID19 ENFEKSİYONU GEÇİREN KOKU VE TAT SEMPTOMU OLAN HASTALARIN TESBİTİ VE ÖNEMİ

Mustafa AVCU*, Fatma YENER 1, Yasemin İLVAN 1, Uğurcan KATKICI 1, Muhammed UĞUR AL 1, Büşra UZAKGİDER 1, Cumali Furkan BOZKURT 1, **Baran ÖZBAŞ 1**, Sadıke KANKURAL 1

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB AD. Kırşehir

1. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf

Giriş: Coronaviridae ailesinde, zarflı, tek zincirli RNA virusudur. Eter, asit ve ısıya duyarlıdır. Soğuk algınlığı veya nezle olarak bilinen üst solunum yolu enfeksiyonuna en sık neden olan virüslerden biridir. Genetik materyalini çevreleyen protein kılıf dışında glikoprotein uzantılarla kaplı bir zarflı çevrilidir. Bu uzantılar taç şeklinde olduğundan CORONA virüs (Taçlı virüs) denir. COVID-19 semptomları genellikle değişkendir fakat ateş, öksürük, yorgunluk, nefes darlığı, koku ve tat alma duyusunda kayıp gibi semptomlar sıkça görülen semptomları arasındadır. Hatta koku ve tat alma bozukluklarının daha spesifik şikayetler olduğu, bu hastaların diğer sağlıklı kişilere hastalığı bulaştırıcılığın daha fazla olduğu iddia edilmiştir. Bu konu ile ilgili çalışmalarda koku ve tat bozuklukları yüzde 5 ila 90 oranında görüldüğü ve bazı ülkelerde daha fazla görüldüğü belirtilmiştir. Koku ve tat duyusu kimyasal duyular olarak bilinirler. Koku ve tat duyusunun değerlendirilmesinde bazı testler yapılsada hastanın subjektif ifadesi ön önemli belirteçtir.

Amaç: Hastalığın şiddeti, hayat kalitesine etkisi ve hastaların bu konu ile ilgili hassasiyet ve yaklaşımları değerlendirilmiştir.

Metod: Anket hazırlanarak her öğrencimiz 10'ar hastaya telefonla ulaşp kendi hazırladığımız anket sorularını yöneltilmişlerdir. Öğrencilerimizle birlikte değişik illerde koronavirüs geçirmiş kişilerin hastalık süreçleri, koku ve tat şikayetlerine karşı tutumları incelenmiştir.

Tartışma: Semptomatoloji literatürle uyumlu idi. En sık görülen semptomlar ateş, öksürük, miyalji idi. Şikayetlerde koku ve tat alma bozukluğu olan yüzde yirmi beşi 15 kişi hastalar daha çok hipoosmi ve kakosmi tanımladı, bundan dolayı hastaneye başvuru 8 Kişi, bu hastalara en sık uygulanan tedavi lokal steroid tedavisi, hastalık tesbiti üzerinden ortalama 4 ay geçen 4 kişinin şikayeti tedaviye rağmen devam ediyor. Koku ve tat bozukluğu olan hastaların hastaneye yatış ile ilişkisi saptanmadı. Koku ve tat bozuklukları tedavisi öncelikle sebebe yöneliktir. Bazı koku ve tatlarla yapılan koku ve tat egzersizleri, çinko, a vitamini, b vitamini, özellikle aktif hastalık dönemi dışında steroid tedavisi önerilmektedir. Ancak kesin kanıtlanmış bir tedavisi yoktur.

Sonuç: Tat ve koku duyuları birbiriyle ilişkili duyulardır. Kötü tat ve kokudan uzaklaşmamızı sağlayan, hoşlandığımız koku ve tatlara ulaşımımızı kolaylaştıran kısaca keyif aldığımız şeylere bizi yaklaştıran bu duyular önemini kaybetmiş gibi görülsede Covid19 pandemi sürecinde bu duyulara ilginin ve bu konu ile ilgili çalışmaların artması bu duyuların önemini ve fonksiyonlarını kavramamızı arttıracak bu konu ile ilgili dahada aydınlanmamıza yardımcı olacaktır.

Anahtar kelimeler: koronavirüs, covid19, koku, tat



POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLARIN ÖNGÖRÜLMESİNDE BELİRTEÇ KARŞILAŞTIRILMASI; ASA VE ARİSCAT

Zeynel Abidin ERBESLER¹, Ahmet TAŞ², Hatice KORU², Şevket ŞENYURT², **Betül KALAFAT**³, İrem ELİAÇIK³, Alperen ERDURAN³, Sultan ŞAHAN³, Betül BALLI³, Sıla Nur ŞEHNAZ³

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırşehir

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 4.Sınıf Öğrencileri, Kırşehir

³Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3.Sınıf Öğrencileri, Kırşehir

Özet

Amaç: Ameliyat sonrası gelişen pulmoner komplikasyonlar önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Amacımız elektif ortopedik cerrahi operasyon geçiren hastalarda, preoperatif dönemde uygulanan American Society of Anesthesiologist (ASA) ve Assess Respiratory Risk in Surgical Patients in Catalonia (ARİSCAT) risk skorlama sistemlerinin postoperatif pulmoner komplikasyonların (PPK) ortaya çıkmasını öngörmeye etkinliğini araştırmaktır.

Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra Nisan 2019 – Ekim 2019 tarihleri arasında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde opere edilmiş 246 elektif hasta çalışmaya alındı. Tüm hastaların cinsiyet, yaş, ASA klinik sınıflamaları, eşlik eden sistemik hastalıklar ve cerrahi türleri kaydedildi ve ARİSCAT risk indeksleri hesaplandı. Postoperatif birinci ayda PPK (atelektazi, pnömoni ve solunum yetersizliği) gelişen hastalar kaydedildi.

Bulgular: Toplam 15 (%6.09) olguda PPK gelişti. PPK gelişme riskinde ASA ve ARİSCAT risk skorlama sistemleri karşılaştırıldığında ARİSCAT daha etkili gibi görünse de anlamlı fark bulunamadı.

Sonuç: ASA ölçeği preoperatif sağlık durumunu subjektif olarak tahmin etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda ARİSCAT ölçeğinin PPK'ları saptamada ASA skoruna göre istatistiki açıdan anlamlı farklılık yaratmadığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: ASA, ARİSCAT, preoperatif değerlendirme



PRİMER KORONER ANJİOGRAFİ YAPILAN HASTALARDA NEFROPATİ GELİŞİMİ

Recep DEMİR¹ Elif Nur BAYKAL¹ Ata ARSLAN¹ Zehra Nur ERKAN¹ Ahmet ESEN¹
Bekir Sami ALPAY¹ Dilara AKGÜL¹ Sefra KAPLAN¹ Kübra DEMİRBAĞ¹ Enis Elvan
SAKALLIOĞLU¹, Alp YILDIRIM²

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Kırşehir

Bu araştırmada Akut Koroner Sendrom ön tanısı ile primer anjiyografi yapılan hastaların rutin laboratuvar testleri üzerinden opak nefropati gelişimini ön gördürücü parametreler var mıdır bunu değerlendirdik.

Araştırmamızda Nisan –Eylül 2019 tarihleri arasında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve Akut Koroner Sendrom ön tanısı ile primer anjiyografi yapılan hastaların dosyaları taranarak bulgular saptanmıştır. Son dönem böbrek yetersizliği olan, diyalize giren ve koroner anjiyografide kritik koroner darlık saptanmayan hastalar çalışmadan çıkarılmıştır. Opak nefropati gelişimi anjiyografi sonrası 24 ve 48. Saatlerde alınan kan örneklerinde serum kreatinin değeri $>0,5$ mg/dl ya da $>\%25$ artışı olması olarak tanımlandı.

Toplam 163 hasta araştırmaya dahil edilmiş olup 139 hastada opak nefropatisi gelişmemişken 24 hastada opak nefropatisi geliştiği saptanmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, komorbite gibi demografik özellikleri her iki grup arasında benzerken laboratuvar tetkiklerinden açlık kan şekeri, HbA1c, nötrofil sayısı ve crp düzeyi nefropati gelişen grupta anlamlı olarak yüksek saptandı. Bunun yanı sıra total kolesterol, ldl, hdl gibi lipit parametreleri nefropati gelişen grupta anlamlı olarak düşük saptanmıştır. Yapılan çok değişkenli regresyon analizinde crp yüksekliği ve ldl düşüklüğü opak nefropati gelişimi açısından bağımsız prediktör değerler olarak gösterilmiştir.

Yapılan bu çalışmada kontrastlı görüntüleme tetkikleri ve koroner anjiyografi sonrası gelişen, hastaneye yatış ve mortalite- morbidite sebeplerinden biri olan opak nefropatisinin önceden öngörülmesi açısından her hastada istenen rutin laboratuvar tetkikleri değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiki analizlerde C- reaktif protein ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol değerlerinin bağımsız öngördürücü parametreler olabileceği saptanmıştır. Ancak kısıtlı hasta sayısı ve retrospektif bir çalışma olması nedeniyle daha geniş kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Nefropati, opak madde. Anjiyografi



TÜRKİYE’DE 2020 YILINDA COVID-19 VE ETKİLERİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ULUSAL TIBBİ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

Alperen DEDEOĞLU, Yener ÇAKIR, Beyza Nur DEMİR, Beyza Nur ERSOY, Feyza ERTÜRK, Saithan KOCAOĞLU, Batuhan KÖYBAŞI, Melih SÖYLEMEZ, Esra TANRIVERDİ, Ezgi YAĞRINCALI, Ömer Faruk ELMAS

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de 2020 yılında ulusal akademik dergilerde yayınlanan tıbbi araştırmaların incelenmesi amaçlanmıştır.

Araç ve Yöntem: Bu çalışmaya sadece ulusal dergilerde yayınlanan tıbbi orijinal araştırma makaleleri, sistematik derleme ve metanalizler dahil edildi. Araştırma makaleleri ve bu makaleleri yayınlayan akademik dergilere Tubitak Ulakbim TR Dizin veri tabanı üzerinden ulaşıldı. Tr Dizin’de indekslenmeyen dergiler çalışma dışı bırakıldı. Dahil edilme kriterlerine uyan tüm makaleler aşağıdaki parametreler açısından incelendi: sorumlu yazarın branşı, toplam yazar sayısı, makalenin dili, makalenin web üzerinde görüntülenme sayısı, makaleye dahil edilen katılımcı sayısı. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel parametreler kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Dahil edilme kriterlerini toplamda 207 makale karşıladı. Bu makalelerde toplamda 3.134.434 katılımcıya ait veriler yer alıyordu. Verileri incelenen ortalama katılımcı sayısı 17.911 idi. Makalelerin 141’inde (% 68,11) tam metin İngilizce, 66’sında (% 31,88) ise Türkçe idi. Makalelerdeki toplam yazar sayısı 1188, ortalama yazar sayısı ise 5.7 idi. Makalelerin web üzerinde toplamda 144310 kez görüntülendiği izlendi. Ortalama görüntülenme sayısı 697 olarak saptandı. Sorumlu yazarın branşı incelendiğinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji % 17.9 ile ilk sıradaydı. Bunu sırasıyla pediatri (%14.7), radyoloji (%11.6) ve iç hastalıkları (%11.6) takip ediyordu.

Sonuç: Çalışmamızın verileri ile ülkemizde 1 yıl gibi kısa bir periyotta, akademisyenlerin yoğun klinik iş yüküne rağmen sadece ulusal dergilerde çok sayıda makale yayınlandığı ve bu makalelerin çok sayıda görüntüleme aldığı ortaya konulmuştur. Çalışmamızın, ülkemiz akademisyenlerinin COVID-19 ile ilgili bilimsel üretim performansına ve uluslararası indeksler kapsamında yayınlanan makalelerine de odaklanan daha geniş kapsamlı çalışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: makale, yayın, pandemi, medikal



AKCİĞER VE BATIN GRAFİSİ ÇEKTİRMİŞ ADÖLESANLARDA SKOLYOZ PREVELANSI

Samet Sancar KAYA**, Bilal ŞAŞMAZ*, Ercüment CERAN*, Fatima BAYDAR*, Aleyna TEKELİ*, Gamze GÜZEŞ*, Zişan TAŞ*, Abdulkadir ASLAN*

* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir

**Ankara Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği, Ankara

Özet

Amaç: Omurgadaki küçük açılı eğrilikler, kozmetik bir deformite oluşturmadığından kolaylıkla gözden kaçır ve fark edilemez. Bu çalışmada akciğer ve batın grafisi çektirmiş adölesanlarda torakal ve lomber skolyoz prevalansını araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sırt-bel ağrısı dışındaki nedenlerle başvurmuş ve akciğer veya batın grafisi çekilmiş adölesan hastaların grafileri ve demografik verileri hastane bilgi yönetim sistemi aracılığıyla geriye dönük araştırıldı.

Bulgular: Bu çalışmada toplam 301 (139 kız, 162 erkek) adölesana ait grafiler değerlendirildi. Akciğer grafisi çektiren adölesanların yaş ortalaması 12.8 ± 2.3 ; batın grafisi çektirenlerin yaş ortalaması 12.4 ± 2.1 idi. Akciğer grafisi çektiren adölesanların ortalama Cobb açıları 2.9 ± 2.8 , batın grafisi çektirenlerin ortalama Cobb açıları 2.8 ± 2.9 idi. Adölesanların %4.65'inde (7 torakal, 7 lomber) 10 derecenin üzerinde skolyoz var idi. 19 (%11.7) erkek, 16 (%11.5) kız adölesanda 6 derecenin üzerinde eğrilik olduğu saptandı. Kız ve erkek adölesanlar arasında yaş ve Cobb açısı bakımından anlamlı fark saptanmadı ($P>0.05$).

Sonuç: Adölesan idiyopatik skolyoz, ilerleyici olabilir ve bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Küçük açılı eğriliklerinde sıklıkla farkedilememesi göz önünde alındığında, çekilen akciğer ve batın grafileri bu hasta grubunu tespit etmede faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Skolyoz; Cobb açısı; Adölesan



COVID-19 PANDEMİSİNİN DİSTAL RADIUS KIRIĞI TEDAVİSİNE ETKİSİ

Beyza HALAC ^[1], Kevser KILIÇLAR ^[1], Aysel KESKİN ^[1], Songül ERDUMAN ^[1], Emre DUMAN ^[1], Fevzi YİĞİT ^[1], Muhammet Salih DEMİRKOL ^[1], Zafer Yağız VANLI ^[1], Kübra UNKUN ^[2], Levent HOROZ ^[3]

[1] Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1 öğrencisi, Kırşehir

[2] Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 2 öğrencisi, Kırşehir

[3] Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Kırşehir

Özet

Giriş: Distal radius kırığı tedavisi uzun zamandır hekimler arasında görüş ayrılığına sebep olmaktadır. 1 yılı aşkın süredir devam eden COVID-19 pandemisi distal radius kırıklarında uygulanacak tedavi görüşlerini etkilemektedir. COVID-19 pandemisinin acile başvuran ortopedi hastalarının dağılımına etkisine yönelik birçok araştırma mevcut olup, distal radius kırığı ve tedavisindeki etkisine yönelik araştırma yoktur. Amacımız COVID-19 pandemi sürecinin distal radius tedavisi ve takibi üzerine olan etkisini ortaya koymaktır.

Yöntem: 2019 ve 2020 yılı 3.ve8.aylar arasında “S52.5,S52.6,S52.9” tanı kodlarıyla acil servise başvuran hastalardan yaş, cinsiyet, başvuru zamanı, tedavi tipi, AO sınıflaması, Ulnar Styloid kırığı, tedavi zamanlaması, yatış süresi, polo kontrol sayısı, konservatif tedavi süresi, açık kırık, radial yükseklik, volar tilt, eklem içi deplasman, radial inklinasyon verileri Microsoft Office 365(Microsoft INC, Redmond,CA,USA) kullanılarak toplanacaktır. Verilerin analizi için SPSSv.17 (SPSS INC, Chicago, IL,USA) kullanılacaktır. Grupların normallik sıralaması için t ve anova testi uygulanacaktır. Kategorik verilerin analizinde Ki kare testi uygulanacaktır. Kırık tiplerinin ve cerrahi oranlarının karşılaştırılmasında Fisher exact testi uygulanacaktır.

Bulgular: Acile kırık nedeniyle başvuran hastaların önemli bir kısmını distal radius kırığı oluşturmaktadır. Distal radius kırıklarının tedavisinde kapalı redüksiyon ve alçılama sık kullanılan yöntem olup instabilite kriterlerine dikkat edilmediğinde yanlış kaynamayla sonuçlanmaktadır. Alçıyla tedavi takibi alınan hastalarda yakın takip önerilmektedir. Pandemi sürecinde Türkiye’de acile başvuran kırık hastalarının sayısında %61 oranında düşüş görülmüştür. Distal radius kırıkları tedavisinde kabul edilebilir cerrahi dışı tedavi sınırları genişletilmiş olup gelişecek yanlış kaynamalar için elektif koşullarda operasyon önerilmiştir. Bu sayede hastaların Covid 19 ile temasının azalacağı ön görülmüştür.

Sonuç: Etik kurula evraklarımızı verdik, bilgi işlemle görüştük. Hasta kayıtlarını istedik nitekim pandemi koşullarından ötürü hasta kayıtlarına ulaşamadık.

Anahtar kelimeler: COVID-19, distal radius kırığı, tedavi tercihleri





Sözlü Sunum No: 32

Araştırma Çalışması



Sözlü Sunum No: 33

Araştırma Çalışması



Sosyal Sorumluluk Proje Özetleri



BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI

Sena SAVASCI*, Şerife KALEM*, Koray OKUMUŞLAR*, Enes Buğra BOZER*, Begüm YILMAZ*, Ayşenur SUNA*, Tuna KIRAÇ*, Kutay ÜSTÜN*, Aybüke YILMAZ*, ElifNur ACIBAL*, Mert Furkan DAL* Mehmet Fatih ALPAY**

* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir

** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahi AD. Kırşehir

Özet

Sosyal sorumluluk projesi 4. grup öğrencileri olarak bu projeyi yürütme amacımız : Sınav kaygısı yüzünden stimulan ilaçların bilinçsizce kullanımını en aza indirip kullananlar üzerindeki gözlenebilen ruhsal bozukluğu önleyebilmek.

Projeyi hazırlama sürecinde önce kendimizi sonra da çevremizi gözlemleyerek bir amaç belirledik. Sonra üniversitelerin ve uzman kişilerin yaptığı deneysel çalışmaları okuyup , videolar izleyip edindiğimiz bilgileri birbirimizle paylaştık. Daha fazla insana bu sorumluluğu kazandırmak için kendi sunum dosyamızı oluşturduk. Sunumumuzu online olarak Zoom uygulaması üzerinden yaptık ve arkadaşlarımızı bilgilendirdik.

Edindiğimiz bilgilere göre birçok genç yoğun performans gerektiren aktivitelere hazırlanırken hastalık tanısı konulmadığı halde kırmızı reçeteli bazı stimulan ilaçlara ulaşip kullanabiliyor. Bu bilinçsiz kullanım beraberinde her geçen gün daha da yaygınlaşan yan etkileri getiriyor. Bu durumda bizim üzerimize düşen elimizden geldiğince bilinçlenmek ve bilinçlendirmek.

Anahtar Kelimeler: Stimulan ilaç, stres, yan etki, sınav



“AŞILAR HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?”

Gülhan ÜNLÜ**, Deniz TOPRAK*, Gülsenem ÇETİN*, İlayda ALTINTAŞ*, Nivin ABDO*, Onur KÜÇÜKCANKURTARAN*, Ömer ÇOBANOĞLU*, Ömer Erdem ŞENTÜRK*, Sena Begüm BAŞYİĞİT*

* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci, Kırşehir

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD. Kırşehir

Sosyal sorumluluk projesi çalışmalarına ilk başladığımız günlerde toplumda bilgi eksikliği olduğunu düşündüğümüz konuları analiz ettik. Bu analizlerimizin sonucunda hocamızın da yardımlarıyla çocuk sağlığı hakkında toplumu bilinçlendirmeyi amaçladık. Kırşehir ilimize ait bir aile sağlığı merkezinde çocuklarda boy, kilo ve tansiyon ölçümü yaptık. Ölçüm sırasında aileleri bilinçlendirmek için çocukların yaşına uygun boy ve kilo ve tansiyon değerleri hakkında bilgilendirme yaptık. Bu ölçümlerin takibinin önemini belirttik. Daha sonra aldığımız boy, kilo ve tansiyon ölçümlerini rapor edip bu verileri, sempozyumda “Toplumdaki Çocuk Sağlığı Bilincinin Derecesi” konusu altında sunum yapmayı hedefledik. Bütün dünyanın ve bizim de hayatımızı oldukça olumsuz etkileyen pandemi süreci ile beraber projemizi askıya almak zorunda kaldık. Pandemi sürecinde aşı karıştırlarının giderek artması ve de pandemiden dolayı projemizi yürütemediğimiz için toplumu aşılarda konusunda bilinçlendirme çalışması yapmaya yöneldik. Amacımız sosyal medya aracılığıyla topluma ulaşarak aşılarda konusunda bilgilendirmek oldu. Bunun için geçmişten günümüze aşılarda ile ilgili bir video çektik. Videomuzda aşının ne olduğundan ve mekanizmalarından kısa ve anlaşılır şekilde bahsettik. Geçmişte yapılan aşılarda insanlığa olan faydasından bahsederek toplumdaki aşılarda önyargısına ve doğru bilinen yanlışlara değindik. Güncel aşılarda çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Ülkemizde kullanılacak aşılarda bahsettik. Bütün bunları kamu spotu niteliğinde seslendirme ve sunum halinde video hazırlayıp insanlara ulaşmasını sağladık. Fakültemiz adına Youtube kanalı açılması çalışmalarımıza hız kattı. Kendi sosyal medya hesaplarımızdan videomuzu paylaştık. Kahoot isimli program aracılığıyla aşılarda hakkında oyun hazırlayıp bu sayede insanları bilgilendirmeyi amaçladık.

Anahtar kelimeler: Pandemi, Covid-19, aşı.



SESİM GELİYOR MU? (Acil Sağlık Hizmetlerine Erişim)

Sude ÇAM, Abdullah SOYDAN, Defne YENİ, Burak KURLUCAN, Gizem DAMAR, Emre CENGİZ, Macide YILMAZ, Oğuzhan KOLAY, Sinem GÜLTEKİN, Sina ASADZADEH, Tala AKBARİASANJAN

Trafik kazaları, deprem, sel, çığ gibi doğal afetler, şehirlerdeki terör olayları ya da herhangi bir yerde meydana gelen acil müdahale gerektiren birçok sağlık sorunlarına acil sağlık hizmetleri organizasyonu ile müdahale edilmektedir. Böylece, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan acil sağlık hizmetleri organizasyonu aracılığıyla insan sağlığı ve yaşamına ilişkin ciddi tehditler karşısında en ideal yaklaşım sergilenmektedir.

Acil sağlık hizmetleri sağlık çalışanları açısından kavraması kolay bir sağlık hizmeti olmasına karşın, barındırdığı karmaşık ve multidisipliner yaklaşımlar nedeniyle toplum tarafından hiç de kolay anlaşılamamaktadır. Bu karmaşık yapı acil sağlık hizmeti bekleyenler üzerinde stres oluşturmakta, korku ve kaygının ötesinde bazen sağlıkta şiddete bile neden olabilmektedir. Bu nedenle toplumun acil sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilinçlenmesi kritik öneme sahiptir. Çünkü olası bir acil durum karşısında, acil yardım talep eden kişi/kişilerin acil sağlık hizmetlerinin organizasyonunu bilmesi, karşılaşılan zor durumla baş edebilmesini kolaylaştıracak ve ideal bir şekilde acil sağlık hizmeti alınmasına olanak tanıyacaktır.

Hazırlamış olduğumuz bu sosyal sorumluluk projesi iki aşamadan oluşmuştur. İlk olarak proje ekibiyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinin acil servisi sorumlu öğretim üyesi eşliğinde gezilerek hastane acil servislerinin işleyişleri, organizasyonu, nasıl acil sağlık hizmeti alınacağı ve hastane öncesi acil sağlık hizmetiyle ilişkisi öğrenilmiştir. Daha sonra Kırşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nün Acil Sağlık Hizmetleri Biriminin desteği ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin (kara ambulansı, hava ambulansı, deniz ambulansı, UMKE) işleyişi, organizasyonu, nasıl acil sağlık hizmeti alınacağı ve hastane acil servisleriyle ilişkisi kurum ziyareti yapılarak kavranmıştır. Projenin ikinci aşamasında Türkiye'de hangi durumlarda nasıl acil sağlık hizmeti talep edileceği, acil sağlık hizmeti talebinin nasıl değerlendirildiği ve nasıl acil sağlık hizmeti sunulduğu hazırlamış olduğumuz sunum ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine fakülteler ziyaret edilerek anlatılmıştır.

Bu projede hedef kitle olarak üniversite öğrencilerini seçmemizin sebebi, toplumda yükseköğrenim gören kişilerle birlikte sağlık hizmetlerine erişim konusunda daha geniş çaplı bir farkındalık yaratmaktır. Böylelikle bu hizmetlere ihtiyaç olduğunda nasıl yararlanılacağını hem üniversite öğrencileri öğrenmiş hem de toplumda yeni bir bilinç oluşmuştur.



ÖĞRENCİLERDE POSTÜR BOZUKLUKLARINA KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ

Ahmet YILMAZ, Ayşenur KARATAŞ, Beyza Nur VARGÜN, İrem ÖZ, İsmail AŞIKHASAN, Mehmet KARAKUŞ, **Samet İNANICI**, Şerife Nur DEVECİ, Zülküf Semih ADA

Özet

Postür (duruş) bozuklukları eğitim-öğretim yıllarında daha sık görülebilir. Öğrencilerin masa başında ve bilgisayar karşısında fazla vakit geçirmeleri bazı duruş bozuklukları meydana getirebilir ve bu bozukluklar ileri yaşlarda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkarabilir. Amacımız ortaokul ve lise öğrencilerinin masa başında ders çalışırken veya bilgisayar kullanırken doğru duruş (postür) şekli hakkında bilgi vermektir.

Grup başkanı ile birlikte 9 kişiden oluşan grubumuzla ve sosyal sorumluluk projesi danışman hocamızla beraber projemizi belirledik. Duruş bozuklukları hakkında detaylı araştırma yapıp bilgi toplayarak postür (duruş) bozuklukları başlığı altında sunum slaytı hazırladık. Sunum yapacağımız okulları belirledik ve belirlediğimiz okullarla görüşüp sunum yapmak için izin aldık. Kırşehir Ahi Evran Lisesinde 120, Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulunda 137, Kırşehir Erol Güngör Ortaokulunda 53 öğrenciye postür bozuklukları ile ilgili sunum yaptık. Bununla birlikte okullarda görsel materyallerden oluşan pano hazırladık ve broşür dağıttık. 2020-2021 öğretim yılında pandemi nedeniyle Kırşehir Aşık Paşa İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul Darıca Fen Lisesi, İstanbul Pendik Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi öğrencilerine online olarak sunum yaptık.

Toplam 6 okulda yaklaşık olarak 450 öğrenciye postür bozuklukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptık ve oluşabilecek sağlık problemleri hakkında bilgiler verdik. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde artan masa başı çalışma ve hareketsiz yaşam nedeniyle bu durumun öneminin daha da arttığının farkına vararak bu konu hakkında daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğine kanaat getirdik.

Anahtar kelimeler: Postür bozuklukları, öğrenci, sağlık



FARKINDALIĞA YOLCULUK

Anıl ÖZÜDOĞRU¹, Ayşen İYİLİ², Duygu Asena ERDOĞAN², Ecem ERCİYES², Feride Hüda EKİNCİ², Furkan BARUT², **Furkan Buğra ALKAN**², Hatice Kübra ÇINKIR², Hikmet Enes UYAR², Hüsna Betül MANGAN², Nisa Deniz KARLIK², Şengül ELBİR²

¹Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

²Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özet

Dünyada neredeyse bir milyon engelli birey yaşamaktadır. Yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde on beşinin çeşitli engellilik durumu bulunmaktadır. Bu sayı her geçen yıl katlanarak artmaya devam etmektedir. Dünyada ki engelli birey sayısının bu kadar çok olmasına rağmen insanlar hala engellileri ötekileştirmekte, onlara karşı yanlış hareketlerde bulunmaktadır.

Bizim amacımız engelliler ve ailelerinin sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve diğer konularda yaşadıkları zorluklara, engelli bireylerin hak ve özgürlüklerine dikkat çekmektir.

Biz bu amaç doğrultusunda engellilere yönelik farkındalığı arttırmak için belirlediğimiz okullarda bazı sınıfları bilgilendirdik. Bu yaptığımız bilgilendirme şunları içermektedir:

Bu farkındalığın küçük yaşlarda edinilmesi toplum açısından daha sağlıklı olacağı için ilkokulları bilgilendirmeyi seçtik.

Bu doğrultuda ilk önce 3. sınıf öğrencilerine engellilik farkındalığı hakkında sunum yaptık. Aynı zamanda bu sunuma öğrencilerin aktif olarak katılmasını sağladık. Yaptığımız sunum engellilik tanımını, engellilerin yaşadığı zorlukları ve engellilerle empati konusu içermektedir.

Sunumun ardından işaret dili ile ilgili bilgi verip birkaç kelime öğrettik ve öğrenciler de bunu denedi.

Empati için çocuklarla beraber tekerlekli sandalyeyi denettik.

Görme engellilerle empati kurmaları için göz bandı taktırarak bastonla yürümelerini istedik.

Bu yaptığımız etkinlikler çocukların üstünde büyük bir etki bıraktı ve onlarda farkındalık oluşturdu. Bunu çocuklardan aldığımız geri dönüşlere dayanarak söylemekteyiz.

Yaptığımız etkinlikler dışında görme engelli bir arkadaşımız için eğitimine yardımcı olmak amacıyla ders notlarını seslendirdik.

Sokakta insanların engellilere zor durum anlarında nasıl tepki verebileceğini ölçmek için sosyal deneyler yaptık.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Empati, Engellilik, Farkındalık



KİŞİSEL HİJYEN EĞİTİMİ

Damla ASLAN*, Beyza Sena SATIRLI*, Betül FİDAN*, Esmâ ASLAN*, Sara ÖZKÜLEKÇİ*, Şevket Emre KARAMANCI*, Elif Süeda TENGİZLER*, Güneş Dinç AKBULUT**

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2 Öğrencileri

** Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel İmmünoloji Anabilim Dalı

Kişisel hijyen, vücudumuzu temizlemek ve bakımını yapmak için yaptığımız el ve tırnak temizliği, burun temizliği, ağız bakımı, ayak hijyeni ve saç bakımı gibi sağlıklı kalmamıza yardımcı uygulamaların genel adıdır.

Amaç: Kişinin kendi ve çevresindeki insanların sağlığını koruyabilmesinin en iyi yolu temizliktir. İnsanlar hijyen kurallarına dikkat ettikleri takdirde hem oluşabilecek hastalıkların önüne geçmiş olur hem de bulaşıcı hastalıkların yayılım riskini azaltırlar.

Biz de hastalıkların önüne geçmek ve bulaşıcı hastalıkların yayılımını azaltmak için ‘Eğitim çocukluktan başlar’ diyerek minik arkadaşlarımıza ve dolaylı yoldan da ailelerine ulaşmayı hedefledik.

Yöntem: Etkili bir sunum ve uygulamalı gösterimler ile kişisel hijyen hakkında ayrıntılı bilgiler verip, doğru bilinen yanlışları düzelterip, eksikleri tamamlayıp, gelen sorulara cevaplar vererek eğitimimizi tamamladık. Ardından onlara verdiğimiz çizelgeler ve hediyeler ile doğru ve düzenli kişisel hijyen uygulamalarının devamlılığına yardımcı olduk. Böylece bilinçli ve sağlıklı çocuklar dolayısıyla da aileler elde ettik. Tüm dünyada yaygın olarak bulunan Kovid-19 öncesi yaptığımız bu bilinçlendirme çalışması salgın günlerinde çocukların ve ailelerin sağlığı açısından oldukça önemli bir yer aldı.

Sonuç: Kovid-19 bulaşına karşı hijyen eğitimi temeli atıldı. Pandemi süresince korunma yöntemleri hakkında bilinçli ve kişisel hijyeninin insan sağlığı üzerindeki etkilerini bilen bir topluluk elde edildi.

Anahtar kelimeler: Kişisel Hijyen Eğitimi, El ve Tırnak Temizliği, Burun Temizliği, Ağız Bakımı, Kovid-19



GIDA TERÖRÜ

Süleyman ERSOY*, Sedanur ÖZGÜL**, **Buket ORHAN****, **Simge ÖZDEMİR****, Rümeysa GÜNER**, Batuhan BAŞ**, Fidan YILDIZ**, Şeyma ÇITAK**, Mahra Dilara KARAKAŞ**, Raziye Nur TAŞDÖVEN **

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Kırşehir

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci, Kırşehir

Özet

Günümüzde özellikle okul çağındaki çocuklarda işlenmiş gıda tüketimi oldukça yaygındır. Bu gıdalardan bazıları hem çocuklar hem de aileler tarafından zararları bilinmesine rağmen tüketilmektedir. Bazı gıdalar ise zararlarından habersiz bir şekilde yararlı olduğu varsayılarak tüketilmektedir. İşlenmiş gıda tüketiminin artması kanser, diyabet, obezite, hipertansiyon gibi hastalıkların çocuklarda da kaygı verici derecede artmasına neden olmuştur.

Bu çalışmanın amacı çocuklara ve ailelerine işlenmiş gıdalar hakkında doğru bilgiler vermek, doğru bildikleri yanlışları düzeltmek ve onlara bu yanlışlar yerine kullanabilecekleri alternatif çözümler vermektir.

Çalışmamızı gerçekleştirmek için alışkanlıkları tam oturmamış ve değiştirilmesi kolay olan 5.sınıf öğrencilerini seçtik. Gözlemler yaparak en çok tükettikleri 10 ürün hakkında bilgi ölçme anketi yaptık. Bu ürünler hakkında sunumlar yaparken aynı zamanda tüketebilecekleri alternatif çözümler verdik. Verdiğimiz bilgilerin yararlılığını görmek için 2. Anketi yaptık ve değişimleri analiz ettik. Öğretmenlerle röportaj yaparak, velilere de mektup yollayarak geri bildirimler aldık.

Sonuç olarak çocuklara beslenme hakkında doğru bilgi verildiğinde beslenme alışkanlıklarını değiştirebildiklerini hatta ailelerinin dahi beslenme alışkanlıklarını etkileyebildiklerini gördük. Bu da bizim eğitimle, yanlış beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıkların önüne geçebileceğimize olan inancımızı güçlendirdi.

Anahtar sözcükler: Çocuk, beslenme alışkanlıkları, işlenmiş gıda, sağlık, çözüm



DOKU VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA KİTLELERİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Aleyna Nur EKER¹, Jıyan TURAN¹, **Ahmet KAYA¹**, Berivan İLHAN¹, Muhammetcan ÜSTÜN¹, Şule ŞAHİN¹, Muhammet Salih KARATAŞ¹, Ubeyt BAŞYİĞİT¹

¹ Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kırşehir

Amaç: Ulaşabileceğimiz en küçük kitleden başlayarak kitleleri organ bağışı hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yanlış bilinen bilgileri düzeltmektir.

Yöntem: Amacımız doğrultusunda, organ bağışı hakkında temel düzeydeki bilgiler, basit bir dille sunum haline getirildi. İlimizdeki üç lise, bir halk eğitim merkezine çalışma grubuna dahil olan kişilere sunum yapılarak sorular cevaplandı ve organ bağışı hakkında broşür dağıtıldı.

Bulgular: Yapmış olduğumuz sunum ve söyleşide katılanların bilgilendiklerini ve organ bağışına olan bakışlarına olumlu bir katkı sağladığımızı gözlemledik. Bir çoğunun konu hakkında bilgi sahibi olmadığını, önyargılarının kırıldığını geribildirimleri ile fade ettiler.

Sonuç: Doku ve organ bağı hakkında önyargılar kaldırılması, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve yanlış bilgileri ortadan kalkması için daha büyük kitlelerle yapılacak daha kapsamlı sunum ve söyleşiler yapılmalıdır. Bunun sonucu olarak; doku ve organ bağışı yapan kişi sayısının artacağı inancındayız.

Anahtar Kelimeler: Doku ve organ bağışı, bilgilendirme, sunum, söyleşi.



SUSUYORUZ (SU İSRAFI FARKINDALIĞI)

Menduha ŞAHİN¹, Nilüfer YEŞİLYURT¹, Yunus Emre DERE¹, Efe Erdem ÇEVİK¹, Zeynep İPEK¹, Zeynep KILIÇ¹, Mustafa TEKİN¹, Ayşe Nur KALEM¹, Hatice Kübra ALTUNCAN¹, Aynur BURHANİ², Gülistan Sanem SARIBAŞ³

¹ KAEÜ Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi,

² KAEÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencisi,

³ KAEÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Özet: Projemizin amacı suyun kıymetinin anlaşılıp korunması ve israfının önüne geçilmesi konusunda farkındalık yaratmaktır. ‘Ağaç yaş iken eğilir.’ Atasözünün de etkisiyle, bu farkındalık yaratma çalışmasını yapabileceğimiz kesimin ilkökul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler olduğunu düşündük. Bu nedenle hedef kitlemizi o yaş aralığından seçmeye karar verdik. Sonrasında Özel Kırşehir Koleji idarecileri ile görüşerek hangi sınıfların çalışmamızı yapmak için uygun olduğunu konuştuk. Projemizi birlikte yürüteceğimiz sınıfları belirledikten kısa bir süre sonra, öğrencilerle tanışmaya ve onlara kendimizi tanıtmaya gittik. Tanışmamızın ardından kolları sıvayıp çalışmalara başladık. Pandemi öncesinde, haftalık düzenli olarak öğrencileri ziyaret ederek; suyun önemi, kullanım alanları, yokluğunda yaşayabileceğimiz olumsuz haller ve suyu korumak için neler yapabileceğimiz hakkında bilgilendirme ve farkındalık yaratma sunumları yaptık. Çocukların yaşlarına yönelik etkinlikler, soru- cevaplar düzenledik. Pandemi sırasında da sunumlarımızı çevrimiçi olarak sürdürdük. Toplamda 180 öğrenciye ulaştık. Bu süreçte öğrencilerle olan konuşmalarımızı düşündüğümüzde ilk başa göre farkındalıklarının, suyu korumaya yönelik bilinçlerinin yükselmiş olması dikkatimizi çekti. Ayrıca, etkinlik düzenlediğimiz belirli bir gruba eğitim öncesinde ve sonrasında su ayak izi değerlerini hesaplamak için hazırladığımız anketleri çevrimiçi olarak uyguladık. SPSS V21 programını kullanarak anket sonuçları ile tanımlayıcı verilerini elde ettik ve istatistiksel analizlerini yaptık. Öğrencilerin su ayak izleri ortalaması eğitimimizden önce 5846,45±2217,26 lt/gün; eğitimimizden sonra ise 5519,09±1925,93 lt/gün olarak saptandı. Eğitim sonrası değerler eğitime öncesine göre azalmış olmasına rağmen bu azalış istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.562).

Anahtar Kelimeler: Su israfı, farkındalık, eğitim, etkinlik, su ayak izi.



BENİM KULÜBÜM YEŞİLAY PROJESİ

Hamza Alp Eren KORKUT*, Mehmet Ali ÖZDEMİR*, Başak Aycan MALLI*, Fatma Büşra ADAM*, Saliha YALÇIN*, Adalet Bilge BAYKAL*, Gamze ASLAN*, Halime YILDIZ*, Ercan ŞİMŞEK*, Yunus MACİT**

*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci, Kırşehir

**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Kırşehir

Amaç: Benim Kulübüm Yeşilay Projesi, Yeşilay'ı aracı olarak kullanarak ilkokul ve ortaokullarda uygulanan, Yeşilay'ı tanıtan ve her türlü alışkanlıklar konusunda bilinç ve farkındalık oluşturan bir projedir. Bu çalışmayla Yeşilaycılık gönüllülüğünü yaygınlaştırarak, ilkokul ve ortaokullarda Yeşilay kulüplerinin kurulmasında ya da aktif hale getirilmesinde öğrencileri teşvik ederek yol gösterici olmak hedeflenmiştir.

Yöntem: Yeşilay'ın bu zamana kadar yürütmüş olduğu faaliyetlerden örnekler verilerek öğrencilere okullarında Yeşilay kulübü kurmaları halinde ne gibi faaliyetlerde bulunabilecekleri anlatıldı. Sağlıklı bir yaşama nasıl kavuşulacağı ve bunda Yeşilay'ın nasıl bir rolü olduğu hakkında çeşitli etkinlikler ve sunumlarla öğrenciler bilgilendirildi.

Öğrencilerle kurulan diyaloglar sonucunda öğrencilerin birçoğunda bilinçsiz internet kullanımı, velilerinde ise sigara kullanımı gibi bazı kötü alışkanlıkların görüldüğü fark edilmiştir. Bu ve benzeri durumlarda sergilemeleri gereken tutum ve davranışlar konusunda bilinçlendirici olmak amaçlandı, konuyla alakalı onlardan çeşitli sözler alındı.

Sonuç: Yapılan programın sonunda doldurulan çeşitli anketlerle öğrencilerden amacımıza ulaştığımıza dair dönütler alındı.

Yeşilay'ı da arkamıza alarak olabildiğince çok sayıda öğrenciye Benim Kulübüm Yeşilay Projesini ulaştırmaya çalışılmış ve bu konuda yoğun bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmamızın programlanması ve yürütülmesiyle ilgili detaylı bilgi sunumumuzda mevcuttur.

Anahtar kelimeler: Yeşilay, okul, farkındalık, alışkanlıklar, kişisel gelişim



OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE YAPTIĞIMIZ FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Ahmet Batuhan KARAPÜR Anıl BAŞAK Ayşenur DURAK Dilara DEMİR Halit ÇOBAN Nida Şevval BÜYÜKTATAR Onur KAYA Sena KARA Tuğçe HALICI Utku YERTÜRK, Ekin ÇELİK

AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ, KIRŞEHİR

Özet

Otizm; tıp literatüründe kabul görmüş, belirtileri erken çocuklukta ortaya çıkan, beraberinde birçok sendromla birlikte seyredebilen nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Otizmlili bireylerde sosyal iletişim dezayıflık, mental retardasyon, topluma uyumsuzluk gibi birçok problem görülebildiği, bu tür sorunların daha hafif hissedildiği normal ve normale yakın bireylerde karşılaşmak oldukça olasıdır. Yaptığımız çalışmada otizmlili bireylerin kimler olduğunu, onlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini, günlük hayatlarında kendilerinin ve ailelerinin ne tür zorluklarla karşılaştığını, toplumun otizmlili bireylere tutumu, otizmlili bireylere karşı negatif yargıların asıl değiştirebileceğimizi, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bunun için ana okulu ziyaretinde bulunduk ve oradaki otizmlili çocukların davranışlarını, sosyal iletişim becerilerini, çevrenin onlara yaklaşımlarını, farklılıklarını inceleme fırsatı bulduk ve gözlemledik. Bu proje kapsamında yaptığımız anaokulu ziyaretleri, bilgilendirme konferansı, sokak röportajları, bilgilendirme videosu gibi çalışmalarda toplumun otizmlili bireylere bakış açılarını değiştirmek, onlara nasıl davranmamız gerektiği konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak, farklılıkları kabul etmek, empati kurmak temel hedefimiz oldu. Çalışmalar sonucu aldığımız dönütlerin olumlu olması, farkındalık ve bilinç oluşturduğumuzu gözlemlememiz ve beraberinde gelen yeni fikirler başarıya ulaşacak bir proje olduğunu gösterdi.

Anahtar Sözcükler: Otizm, Sosyal İlişkiler, Çocuk, Aile, Toplum



DUMANSIZ FAKÜLTEMİZ İÇİN ADIM ADIM

Sevval ÜNEŞİ¹ Kübra KOÇAŞ¹–Sevde YURTSEVEN¹–Alişan DUACI¹–Berfin DEMIRKIRAN¹–Belkıs BAKMAZ¹ Gülhanım DEVECİ¹–Ülken Tunga BABAOĞLU²

¹ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri

² Kırşehir Ahi Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Özet:

Biz ikinci sınıf tıp fakültesi öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projemiz adı altında “dumansız fakültemiz için adım adım” projesini gerçekleştirdik. Geleceğin hekimleri olarak projemizin amacı doğrultusunda fakültemizde daha temiz ve sağlıklı bir ortam gerçekleştirmeye çalıştık. Bu amaçla fakültemizde dumansız hava sahaları belirledik. Aynı zamanda şehrimizde yaşayan insanları sigaranın zararları hakkında bilinçlendirmek için hastanemizde standlar açtık. Standımızı ziyarete gelen insanlara çeşitli broşürler dağıttık ve bilgilendirici videolar izleterek sigaranın zararları hakkında bilgilendirdik. İnsanların büyük kısmının sigara kullandığı ve bunu bırakmak istediklerine şahit olduk. Sigarayı bırakmaları için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini açıkladık. Pandemi yüzünden okulumuza gelemeyen 1. sınıf öğrencilerine çevrimiçi bir toplantı düzenleyerek projemiz hakkında bilgilendirme yaptık. Toplantı başında bir anket düzenleyerek öğrencilerin sigara kullanma oranlarını tespit etmeye çalıştık. Öğrencilerin belli bir bölümünün (%16 kadarının) sigara kullandığını anket sonuçları doğrultusunda gördük. Daha önce yayımlanmış olan makalelere baktığımızda üniversite eğitimi alan öğrencilerin %32.3 kadarının sigara kullandığı açıklanmıştır. Yapılan araştırmalar tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanma oranının her sene arttığını göstermektedir. Sosyal sorumluluk projesi grubumuz olarak bu olumsuz durumu en aza indirmeyi hedefledik.

Anahtar Kelimeler: sigaranın zararları , öğrenciler ve sigara , dumansız hava sahası, sigarasız yaşam, tıp fakültesi



TÜM DÜNYA EL ELE, KANSERE GÜLE GÜLE

M. Burak KARATAŞ¹, Tarık BAYKARA¹, Ümmühan ERDOĞAN¹, Nazire Nur KURT¹, Zeynep MUTLU¹, Davut Eren CANBUDAK¹, Cemaziye DEĞİRMENCİ², Sara Abed EL-HALİK², Fatma Filiz ARI³

¹ KAEÜ Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi

²KAEÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencisi

³KAEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Özet: Bu sosyal sorumluluk projesindeki amacımız, Kırşehir merkez ilçede mümkün olduğunca fazla sayıda bireye ulaşarak prostat ve meme kanserinin erken tanı ile önlenilebileceği konusunda farkındalık yaratmaktır.

Bu kapsamda, önce proje faaliyet planı hazırlandı ve işbölümü yapıldı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerle projemiz tanıtılarak işbirliği sözü ve etkinlikler için gerekli izinler alındı. KETEM’den farkındalık etkinliklerinde kullanılmak üzere 1000 adet prostat kanseri bilgilendirme, 1000 adet meme kanseri bilgilendirme broşürü ve 10 adet erken tanı afişi sağlandı. Ayrıca grubumuz 100 farkındalık kurdelesini ve 2 pankart hazırladı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 10 kıraathanede (Aydost, Sevenler, Huzur, Acarçay, Kocaçay, Çınaraladı, Kırk, Orhan Tura, Tayfun Akgüç, Durak) ve Kırşehir kent merkezinde yapılan Yöresel Ürünler Festivalinde gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 1000 broşür dağıtılarak prostat kanserinin belirtileri ve korunma hakkında erkeklere bilgi verildi ve 40 yaşından itibaren düzenli muayenenin önemi vurgulandı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen etkinliklerde ise 1000 adet broşür dağıtılarak kadınlara meme kanserinin erken dönemde tespit edilebilen bir kanser türü olduğu anlatıldı, erken tespit için düzenli bireysel meme muayenesi ve 40 yaşından itibaren mamografi çektirilmesinin önemi vurgulandı.

Düzenlemiş olduğumuz 13 farklı etkinliğimizde, i) kullanılan stant, afiş, broşür ve pankartların hayli dikkat çekmesi, ii) prostat ve meme kanserinin önlenilebilir hastalıklar olduğu ve düzenli muayenenin kanser ile mücadeledeki öneminin 2000’den fazla Kırşehir’liye anlatılmış olması ve iii) uyandırdığımız güven ile halkın diğer sağlık sorunlarını da dile getirmeleri projemizin hedefine ulaştığını kanıtlayan unsurlardır. Buna ek olarak, başarıyla tamamladığımız sosyal sorumluluk projemizin gerek hazırlık gerekse etkinlikleri sırasında gerçekleştirilen aktivitelerin iletişim kurma becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olduğunu, Üniversitemiz ve Kırşehir’i daha yakından tanıma olanağı sağladığını da belirtmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk, Bilinçlendirme, Erken tanı, Prostat kanseri, Meme kanseri.



DİJİTAL OBEZ OLMA

Ayşe DİRİCAN*, Suzan DOĞAN *, Afra ÇELİK*, Sefa SARI*, Ömer Altuğ ÖZKAN*, Suzan AVCI*, Zeliha ARICI*, Yasin PEKUZ*, Betül TEZGEL*

* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir Türkiye

Özet:

Günümüz problemlerinden teknoloji bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili farkındalığın ne kadar erken yaşta olursa o kadar etkili olacağı düşüncesi ile öncelikle annelere sonrasında ilkökul ve ortaokul öğrencilerine Teknoloji Bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla bilgilendirici sunumlar yaptık. Her kesime ayrı ayrı hitap etmemiz gerektiğinden 3 ayrı sunum hazırladık Çocuklara ‘Ne Kadar Teknoloji Bağımlıyısın?’ testini uyguladık. Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için alternatif önerilerde bulunduk. Bunu çeşitli oyunlarla ve karikatürlerle destekledik. Annelere yaptığımız sunum sonucunda; anneler, çocuklarına zaman geçirmek amacıyla verdikleri telefon, tablet, bilgisayar vb. dijital aletlerin onların teknoloji bağımlısı bireyler olmalarına ön ayak olduklarını fark ettiler. İlkokul ve ortaokul grubuna yaptığımız sunumlar ve ‘Ne Kadar Teknoloji Bağımlıyısın?’ test sonucunda; aslında çocukların teknolojinin kontrolsüz kullanımının doğuracağı kötü sonuçların farkında olduklarını gördük. Ancak alternatif çözümleri yoktu. Biz de bu konuda öğretmen ve öğrencilere çeşitli çözüm önerileri sunduk. Müzik aleti çalma, yabancı dil öğrenme, kitap okuma, kutu oyunları ve aileyle kaliteli vakit geçirme gibi alternatif çözümler sunduk. Kendilerinin ve öğretmenlerinin gözünden de durumun ciddiyetini fark etmelerini sağladık.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Bağımlılık, Çocuk, Anneler, Dijital diyet



Sempozyum Programı

KAEÜ Tıp Fakültesi Toplantı Salonu-Online			
Saat	Program	Konu	Üniversite
Açılış			
10:00-10:15	Betül SULUBULUT Beyza Nur DEMİR Ayşe DİRİCAN	- Sempozyum takdimi - Açılış Konuşması	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Sempozyum Başkanları
10:15-10:20	Prof.Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL	Açılış Konuşması	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
I. Oturum			
10:20-10:40	Prof.Dr. Vatan KARAKAYA	“Ahilik Değerinde İnsan”	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü
10:40-11:20	Prof.Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN	“Toparlanın Tuşluyoruz”	YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
II. Oturum			
11:20-12:00	Prof.Dr. Aykut ÖZDARENELİ	“COVID-19 Aşı Çalışması”	Erciyes Üniversitesi Mikrobiyoloji AD

63

Sözlü Sunumlar-Online Program		
12:20-12:30	TANITIM (Araştırma Grubu Projeleri) Link:	TANITIM (Sosyal Sorumluluk Projeleri) Link:
	I. Oturum	II. Oturum
12:30-13:50	Oturum Başkanları: SÜMEYRA ASLAN - HÜDANUR İNCE	Oturum Başkanları: ESMA ASLAN - MENDUHA ŞAHİN
12:30-12:40	1. COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİ VE ÖNCESİNDE SAĞLIKTA ŞİDDET Güneş KÜÇÜK, Eylül Ece KILIÇLI, Selcan TAY, Esma Berivan SELÇUKOĞLU, Ömürçan Sadettin AYDIN , Mustafa AĞCA, Ayetullah TUNCEL, Burak Emre ASLAN, Reşit KAVAKLI, İbrahim EROĞLU	1. BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI Sena SAVAŞCI , Şerife KALEM, Koray OKUMUŞLAR, Enes Buğra BOZER, Begüm YILMAZ, Ayşenur SUNA, Tuna KIRAC, Kutay ÜSTÜN, Aybüke YILMAZ, ElifNur ACIBAL, Mert Furkan DAL Danışman: Mehmet Fatih Alpay
12:40-12:50	2. ACİL SERVİSE BAŞVURAN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARDA HEMOGLOBİN VE ÜRE DÜZEYİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ Muhammet Furkan BEKMEZ, Abdullah Gürkan ACAR, Yunus Ömer ŞAHİN, Buse BAYDEMİR, Ahmet Kemal UYGUN, Mehmet ORHAN, Betül KAÇMAZ, CANSEL YILDIRIM , Sercan EROĞLU	2. “AŞILAR HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?” Gülhan ÜNLÜ, Deniz TOPRAK, Gülşenem ÇETİN, İlayda ALTINTAS , Nivin ABDO, Onur KÜÇÜKCANKURTARAN, Ömer ÇOBANOĞLU, Ömer Erdem ŞENTÜRK, Sena Begüm BAŞYİĞİT
12:50-13:00	3. COVID 19 GEÇİREN ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	3. SESİM GELİYOR MU? (Acil Sağlık Hizmetlerine Erişim)



	Kerem AKIN , Ziyet YILMAZ, Hale ALTUNER, Ecrin ÖZDEMİR, Buse TÜRKMEN, Emirkan YILDIZ, İremnur SÜME, Yusuf Ziya ÖZGÜLTEKİN, Ramazan DULKADİR	Sude ÇAM , Abdullah SOYDAN, Defne YENİ, Burak KURLUCAN, Gizem DAMAR, Emre CENGİZ, Macide YILMAZ, Oğuzhan KOLAY, Sinem GÜLTEKİN, Sina ASADZADEH, Tala AKBARIASANJAN
13-00-13-10	4. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE DERS ÇALIŞMA SAATLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Enes KOÇ*, Muhammed Emir SÜMER , Sefa BADEM, İsmail BÖREKÇİ, Melihcan YAĞMUR, Ceyda Gül Hifa BAYHAN, Aslıhan TÜYSÜZ, Sümeyra ASLAN, Nazlı Nur ALTUN	4. ÖĞRENCİLERDE POSTÜR BOZUKLUKLARINA KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ Ahmet YILMAZ, Ayşenur KARATAŞ, Beyza Nur VARGÜN, İrem ÖZ, İsmail AŞIKHASAN, Mehmet KARAKUŞ, Samet İNANICI , Şerife Nur DEVECİ, Zülküf Semih ADA
13-10-13-20	5. GERİATRİK KALÇA KIRIĞI HASTALARINDA CERRAHİ TEDAVİ ALAN VE ALMAYANLARIN 1 YILLIK MORTALİTE ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Beyza SAHAN , Merve GÜNER, Bilal AKYOL, Ece KAPLAN, Halil İbrahim KÖZOĞLU, Engin YAPICI, Ahmet Koray KARAIŞLI, Havva Nur TÜRKÖĞLU, _Hakkı Çağdaş BASAT	5. FARKINDALIĞA YOLCULUK Anıl ÖZÜDOĞRU, Ayşen İYİLİ, Duygu Asena ERDOĞAN, Ecem ERCİYES, Feride Hüda EKİNCİ, Furkan BARUT, Furkan Buğra ALKAN , Hatice Kübra ÇINKIR, Hikmet Enes UYAR, Hüsnâ Betül MANGAN, Nisa Deniz KARLIK, Şengül ELBİR
13-20-13-30	6. ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA TELEFON TAKİP SİSTEMİNİN EGZERSİZ TEDAVİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ezgi Feyza AYDIN Furkan Ali UÇAR Beyza Nur KARTAL Sare YILMAZ Şevval Beyza ÇELİK Batuhan ŞAHİN Umut GÜNTEMUR Mualla ÖZSÖZ	6. KİŞİSEL HİJYEN EĞİTİMİ Damla ASLAN , Beyza Sena SATIRLI, Betül FİDAN, Esma ASLAN, Sara ÖZKÜLEKÇİ, Şevket Emre KARAMANCI, Elif Süeda TENGİZLER, Güneş Dinç AKBULUT
13-30-13-40	7. OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN TÜRK POPULASYONUNDA GPX1 Pro198Leu ve MnSOD Ala16Val ANTİOKSİDAN ENZİM GEN POLİMORFİZMLERİ VAR MI? Harun SOYALIÇ, Eren SERİN , Ceren ÖZDAĞ, Bedriye Rumeysa YUMUŞAK, İdil KOCA, Furkan SARIYILDIZ, Selin SAKALLI, Ayşenur Zehra YILMAZ, Hasan Hüseyin DEMİR, Mert EFE, Mehmet Ali AKGÜN	7. GIDA TERÖRÜ Süleyman ERSOY, Sedanur ÖZGÜL, Buket ORHAN, Simge ÖZDEMİR , Rumeysa GÜNER, Batuhan BAŞ, Fidan YILDIZ, Şeyma ÇITAK, Mahra Dilara KARAKAŞ, Raziye Nur TAŞDÖVEN
13-40-13-50	8. COVID-19 GEÇİREN BİREYLERİN HASTALIK SONRASI KORUNMAYA YÖNELİK TEDBİRLERE UYMA DURUMU Nazlı ÇELİK, Melisa GÜLER, Ercan KOZAN, Şerife Nur AKYÜREK , Nihal BAYRAKTAR, Berivan HAYKIR, Mustafa ORDU, Kübra YILDIZ, Furkan DOĞAN, Buse ACIGÖZ	8. DOKU VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA KİTLELERİN BİLGİLENDİRİLMESİ Aleyna Nur EKER, Jiyan TURAN, Ahmet KAYA , Berivan İLHAN, Muhammetcan ÜSTÜN, Şule ŞAHİN, Muhammet Salih KARATAŞ, Ubeyt BAŞYİĞİT
13-50-14-00	TANITIM	TANITIM
	III. Oturum	IV. Oturum
14-00-15:20	Oturum Başkanları: BEYZA NUR AYDIN - AYŞE DİRİCAN	Oturum Başkanları: EMRE AKAR- ÖMÜRÇAN AYDIN
14-00-14-10	9. DÜNYA TARİHİNDEKİ BÜYÜK SALGINLAR	9. SUSUYORUZ (SU İSRAFI FARKINDALIĞI)



	Demir E, Zeytun E, Yıldız E, Donat H, DEMİR İ. Sarıkaya N, Ayoub Z, Sarı Z.	Menduha ŞAHİN , Nilüfer YEŞİLYURT, Yunus Emre DERE, Efe Erdem ÇEVİK, Zeynep İPEK, Zeynep KILIÇ ¹ , Mustafa TEKİN, Ayşe Nur KALEM, Hatice Kübra ALTUNCAN, Aynur BURHANİ, Gülistan Sanem SARIBAŞ
14-10-14-20	10. BİREYLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KORKU DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dilek KUZAY AKSOY, Beste DAYAN, Hüdanur AKKÖZE, Osman Mert YILDIZ , Zeynep IŞIK, Can Erce ŞAHİNKUŞ, Emine AYGİN, Rukiye BÜYÜKDEVECİ, Mehmet Furkan AKGÜN	10. BENİM KULÜBÜM YEŞİLAY PROJESİ Hamza Alp Eren Korkut, Mehmet Ali Özdemir , Başak Aycan Mallı, Fatma Büşra Adam, Saliha Yalçın, Adalet Bilge Baykal, Gamze Aslan, Halime Yıldız, Ercan Şimşek, Yunus MACİT
14-20-14-30	11. AİLE HEKİMLERİNİN KOAH TANI VE TEDAVİSİNE YAKLAŞIMLARININ ARAŞTIRILMASI: KIRŞEHİR İL ÖLÇEĞİ Büşra AKPINAR , İrem KESER, Çiğdem ATLI, Elif Esin BAKIN, Esranur KAĞITLI, Hilal BAYRAKTAR, Hüdanur İNCE, Muhammed Furkan ÖZ, Nazlı BİLEN, Berat Boran KURNAZ, Mehmet Cihan YAVAŞ	11. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE YAPTIĞIMIZ FARKINDALIK ÇALIŞMASI Ahmet Batuhan KARAPÜR Anıl BAŞAK Ayşenur DURAK Dilara DEMİR Halit ÇOBAN Nida Şevval BÜYÜKTATAR Onur KAYA Sena KARA Tuğçe HALICI Utku YERTÜRK Dr.Ekin ÇELİK
14-30-14-40	12. COVID-19 PANDEMİSİ VE AŞILARA DAİR TUTUMLARIN İNCELENMESİ Medine Rana KARATEKELİ , Beyza Gül AMANET, Metin ŞİRECİ, Güneş BAYRAM, Öznur ÖZ, İlayda Elif KARCIOĞLU, Ahmet Erdem ESKİN, Hasan ER, Seda KANDEMİR, Mehmet Sait	12. DUMANSIZ FAKÜLTEMİZ İÇİN ADIM ADIM Şevval ÜNESİ Kübra KOÇAŞ-Sevde YURTSEVEN Alişan DUACI-Berfin DEMİRKIRAN-Belkıs BAKMAZ Gülhanım DEVECİ ¹ -Ülken Tunga BABAOĞLU
14-40-14-50	13. ACİL SERVİSE MÜRACAAT EDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Osman BEKTAŞ, Berfin Elif KARAMAN , Gülgüşa BUCAK, Beria Binnaz KUZU, Huriye Hümeysra DURAN, Şeyma KARAOSMANOĞLU, Yeliz BAKIR, Çağrı AKCAN, Onur BURGUCU, Hacı Mehmet ÇALIŞKAN	13. TÜM DÜNYA EL ELE, KANSERE GÜLE GÜLE M. Burak KARATAŞ , Tarık BAYKARA, Ümmühan ERDOĞAN, Nazire Nur KURT, Zeynep MUTLU, Davut Eren CANBUDAK, Cemaziye DEĞİRMENCİ, Sara Abed EL-HALİK, Fatma Filiz ARI
14-50-15-00	14. COVID-19 PANDEMİSİNİN BESLENME VE HAREKET ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Ahmet Salih CEYLAN , Feyza SERT, Aslı İnsal, Elfin Sueda Çoban, Aslı Karabulut, Ali Rıza Kazel, Zeynep Belemir Baltacı, Makhdud Makhdudov, Bekir BULUT	14. DİJİTAL OBEZ OLMA Ayşe DİRİCAN, Suzan DOĞAN, Afra ÇELİK, Sefa SARI , Ömer Altuğ ÖZKAN, Suzan AVCI, Zeliha ARICI, Yasin PEKUZ, Betül TEZGEL
15-00-15-10	15. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CORONAVİRUS HAKKINDAKİ FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Zehranur Dağdelen , Hüma Münteha Erdoğan, Yiğit Alp Yaşın, Esra Öz, Keziban Tuğba Toprak, İlayda Sancak, Gülay Dursun, Esra Şanlı, Kağan Tur	15.
15-10-15-20	16. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ ANALİZİ	16.



	Ali Rıza PAYAM, Barış YAKUT, Fatih YILDIRIM, <u>Gözde ATEŞ</u> , Müzeyyen Gizem PARMAK, Sena Melis ERKAL, Seyit PINARBAŞI, Betül SULUBULUT, Süleyman GÜLDAĞI, İrem MERTOĞLU, Batuhan BOZKURT, Mustafa KARA, Barış ÇIPLAK	
15-20-15-30	TANITIM	TANITIM
	V. Oturum	VI. Oturum
15-30-16-50	Oturum Başkanları: EMRE AKAR- ÖMÜRÇAN AYDIN	Oturum Başkanları: BEYZA NUR AYDIN - AYŞE DİRİCAN
15-30-15-40	17. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HPV VE HPV AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ Sümeyye KIŞLALI, Deniz ERİM, Muhammed SUNGUR, Ömer Faruk YURDAKUL, Mücahit Cafer DOKUMACI, Zeynep Rumeysa CANDEMİR, <u>Senol ÇAKIR</u> , Mustafa TEKİN Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU Barış ÇIPLAK	17.
15-40-15-50	18. KAEÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ <u>Esmâ GÜZELOĞLU</u> , <u>Deniz SENTÜRK</u> , Nezaket DEMİRDELEN, Derya ÜNLÜTÜRK, Yeşim ÖZ, Emine Betül TUFAN, Esmâ Hüsne TORUN, Ahmet Selim DUYGU, Naime Meriç KONAR	18.
15-50-16-00	19. TIP FAKÜLTESİNDE OKUYAN VE OKUMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Mustafa ÇELİK, Oğuz Furkan TETİK, Burak BUZ, Mehmet ÖZKAN, Üzlifet KURNAZ, Oğulcan SORHAN, Hamit YILMAZ, Ravza GÖLEÇ, <u>Aybüke Gizem ÇAKIN</u> , Nuray ALBAR, Berkan TÜLEK	19.
16-00-16-10	20. COVID 19 DÖNEMİNDE PANDEMİ ACİL POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERİN LABORATUVAR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ <u>Hüseyin Mert YÜKSEL</u> , Beyza BAYRAKDAR, Burak Ali ÖZDEMİR, Ayşe KAMACI, Sibel UÇUCU, Hakan Koray SÖĞÜT, Ali Barış ÜSTÜNDAĞ, Merve BAĞ, Barış ÇIPLAK, Eyüp Gökhan TURMUŞ	20.
16-10-16-20	21. COVID-19 GEÇİREN KİŞİLERDE EREKTİL DİSFONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNÇALIŞMA Erol Erşekerci, Beyza Nur AVARA , Esra Yetimova, Alperen Güneş, Beyza Nur Aydın, Sıla Yaren Erdoğan, Yunus Emre Bağçacı, Hakan Bilçen, M.Şahin Bağbancı, İbrahim Üntan	21.



16-20-16-30	22. ŞİZOFRENİDE İNTİHAR İÇİN RİSK OLUŞTURAN KAN PARAMETRELERİ Bilal İLANBEY, <u>Emine DEMİR</u> , Merve Nurten LÜLE, Emre AKAR, Beyza AKALIN, Nilay AÇACAK, Meriç KAVUTÇU, Ahmet GÜNAYDIN, Ramazan YILDIRIM, Büşra EKİCİ	22.
16-30-16-40	23. AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA DUYGUDURUMUN VE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ <u>Sedanur GEDİKBAŞ</u> , Ramazan AYAN, Elif İŞİK, Esra Nur KARATAY, Raziye AKIN, Yusuf ÇİFTÇİ, Asuman ÇELİKBİLEK	23.
16-40-16-50	24. HİPOKAMPAL-ASTROGLİAL HÜCRELERDE 4-AMİNOPİRİDİN KAYNAKLI İN VİTRO EPİLEPSİ MODELİNDE GLUTAMAT EKŞİTOTOKSİSİTESİ VE TRPC1 KATYON KANALLARI ÜZERİNE HİPERİSİN VE KURKUMİNİN ETKİLERİNİN MOLEKÜLER TEKNİKLERLE İNCELENMESİ Bilal ÇİĞ, Ekin ÇELİK, G. Sanem SARIBAŞ, Dilek KUZAY, S. Ata AYDIN, E. Batuhan AKÇALI, Hilal EROĞLU, B. Hasan KAYA, Ş. Berkay AZGİNOĞLU, Emir GÖKTÜRK, Ümran AYDEMİR, Nihan YILMAZ, Caner GÜNAYDIN	24.
16-50-17:50	Ara	Ara
17:00-18:20	VII. Oturum Oturum Başkanları: BEYZA ŞAHAN - KEVSER KILIÇLAR	
17:00-17:10	25. COVİT19 ENFEKSİYONU GEÇİREN KOKU VE TAT SEMPTOMU OLAN HASTALARIN TESBİTİ VE ÖNEMİ Mustafa AVCU, Fatma YENER, Yasemin İLVAN, Uğurcan KATKICI, Muhammed UĞUR AL, Büşra UZAKGİDER, Cumali Furkan BOZKURT, <u>Baran ÖZBAŞ</u> , Sadike KANKURAL	
17:10-17:20	26. POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLARIN ÖNGÖRÜLMESİNDE BELİRTEÇ KARŞILAŞTIRILMASI; ASA VE ARİSCAT Zeynel Abidin ERBESLER, Ahmet TAŞ, Hatice KORU, Şevket ŞENYURT, <u>Betül KALAFAT</u> , İrem ELİAÇIK, Alperen ERDURAN, Sultan ŞAHAN, Betül BALLI, Sıla Nur ŞEHNAZ	
17:20-17:30	27. PRİMER KORONER ANJİOGRAFİ YAPILAN HASTALARDA NEFROPATİ GELİŞİMİ Recep DEMİRİ, Elif Nur BAYKAL, Ata ARSLAN, Zehra Nur ERKAN, Ahmet ESEN, Bekir Sami ALPAY, <u>Dilara AKGÜL</u> , Sefra	



	KAPLAN, Kübra DEMİRBAĞ, Enis Elvan SAKALLIOĞLU, Alp YILDIRIM	
17:30-17:40	28. TÜRKİYE'DE 2020 YILINDA COVID-19 VE ETKİLERİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ULUSAL TIBBİ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ Alperen DEDEOĞLU, Yener ÇAKIR, Beyza Nur DEMİR, Beyza Nur ERSOY, Feyza ERTÜRK, Saithan KOCAOĞLU, Batuhan KÖYBAŞI, Melih SÖYLEMEZ, Esra TANRIVERDİ, <u>Ezgi YAĞRINCALI</u> , Ömer Faruk ELMAS	
17:40-17:50	29. AKCİĞER VE BATIN GRAFİSİ ÇEKTİRMİŞ ADÖLESANLARDA SKOLYOZ PREVELANSI Samet Sancar KAYA, Bilal ŞAŞMAZ, <u>Ercüment CERAN</u> , Fatima BAYDAR, Aleyna TEKELİ, Gamze GÜZEŞ, Zişan TAŞ, Abdulkadir ASLAN	
17:50-18:00	30. COVID-19 PANDEMİSİNİN DİSTAL RADİUS KIRIĞI TEDAVİSİNE ETKİSİ <u>Bevza HALAC</u> , Kevser KILIÇLAR, Aysel KESKİN, Songül ERDUMAN, Emre DUMAN, Fevzi YİĞİT, Muhammet Salih DEMİRKOL, Zafer Yağız VANLI, Kübra UNKUN, Levent HOROZ	
18:00-18:10	31.	
18:10-18:20	32.	
18:20-18:30	Kahve Arası	Kahve Arası
18:30	ÖDÜL VE KAPANIŞ TÖRENİ	

68



Sponsorlar





Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi **TIP FAKÜLTESİ**



70

*Sempozyumda sunulan bildirilerin her türlü imla hataları ve etik sorumluluğu
yazar/yazarlara aittir.*

Copyright © Mayıs 2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi



4. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu
Program & Özet Bildiri Kitapçığı
22 Mayıs 2021

